

УДК 636.085.52

НОВИКОВА М.С., студентка

Научный руководитель **ИСТРАНИН Ю.В.**, канд. с.-х. наук, ассистент
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА СКАРМЛИВАНИЯ МОЛОЧНЫХ КОРМОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ

При организации кормления молодняка необходимо учитывать специфику периодов их развития. Первые шесть месяцев жизни телят отличаются наибольшей интенсивностью их роста. Поэтому именно в этом возрасте требования телят к полноценности кормления наиболее высокие. Они должны быть обеспечены необходимым количеством энергии, полноценного белка, минеральных веществ, витаминов. От этого зависит не только рост, но и сопротивляемость телят к различным заболеваниям.

Целью работы является изучение влияния длительности и количества скармливания молочных кормов на рост и развитие телят белорусской черно-пестрой породы в СПК «Заря - Агро».

Для достижения поставленной цели на ферме были сформированы две группы телок ($n=12$) по принципу пар-аналогов с учетом породы, породности, возраста, живой массы и состояния здоровья. Условия содержания молодняка всех групп были одинаковыми. Телята первой контрольной группы получали 300 кг цельного молока и 40 кг ЗЦМ (в сухом виде), второй группы соответственно – 200 и 35. В опыте длительность молочного периода составляла 6 месяцев для телят I группы и 4 месяца для аналогов II группы.

Расход кормов на 1 голову за период выращивания был ниже у сверстников II группы, чем в контроле на 15 корм. ед. (2,6 %). Живая масса телят в конце периода выращивания составила 146 и 151 кг в I и II группах соответственно.

За весь период опыта телята II группы характеризовались более высокими среднесуточными приростами живой массы и превосходили телят I контрольной группы на 26 г (3,8 %), что составило 652 и 678 г в I и II группах. За период выращивания затраты кормов на единицу прироста составили 4,84 корм. ед. в I контрольной группе и 4,75 корм. ед. во II опытной группе, что на 0,09 корм. ед. меньше.

Таким образом, с целью рационального использования кормовых ресурсов хозяйства при выращивании телят от рождения до 6-месячного возраста в летний период рекомендуется скармливать в рационе молочных кормов не более 200 кг цельного молока и 35 кг ЗЦМ (в сухом виде), с последующим сокращением длительности молочного периода.