Таблица 1 - Динамика показателей, характеризующих состояние печени у коз зааненской породы в зависимости от месяца сукозности

Показатель	Сукозные козы					Несукозные козы	Норма
	1 месяц сукозности	2 месяц сукозности	3 месяц сукозности	4 месяц сукозности	5 месяц сукозности		
АлАТ, МЕ	7,5±1,2	8,5±0,9	11,5±0,85	12,5±1,1	14,55±1,25*	8,0±0,55	6,5-7,9
АсАТ, МЕ	5,5±0,8	6,2±1,1	8,15±1,3	9,66±1,25	14,5±1,3*	7,2±0,46	5,5-8,0
ЩФ,МЕ/л	55,5±9,95	69,8±7,85	89,74±8,5	142,3±12,5	180,5±11,55*	55,6±4,2	21-183
Общий билирубин, ммоль/л	5,5±1,25	8,5±1,3	10,55±1,25	12,5±1,55	14,6±2,01*	5,8±1,05	0,17-9,55

Примечание. *- статистически достоверно относительно показателей животных контрольной группы (p<0,05).

УДК 376.1
КРЫНИН Т.Д., студент (Туркменистан)
Научный руководитель **Курыло О.В.**, магистр психол. наук, старший преподаватель
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика Беларусь

«БАРЬЕРЫ» В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ

Многочисленные примеры из исторической практики взаимодействия культур свидетельствуют, что в самом процессе межкультурной коммуникации изначально заложен конфликтный потенциал. На пути к взаимопониманию в процессе коммуникации люди, сталкиваясь с разнообразными этнокультурными интересами и различиями, вынуждены добиваться более полного и адекватного понимания себя и партнеров. Для этого зачастую приходится пересматривать некоторые ценности собственной культуры. Кроме того, партнеры по коммуникации по-разному и с разной степенью адекватности реагируют на культурные особенности друг друга. Отсюда и диапазон таких реакций достаточно широк – от пассивного неприятия ценностей других культур до активного противодействия их проявлению и утверждению.

В широком смысле слова «барьеры» определяются как проблемы, возникающие в процессе взаимодействия, препятствующие ему или снижающие его эффективность. В межкультурной коммуникации выделяют следующие «барьеры»: допущение сходства; языковые различия; ошибочные интерпретации невербальных действий; влияние стереотипов и предрассудков; бессознательное стремление давать оценку всем незнакомым культурным явлениям; тревога и напряжение из-за неопределенности поведения партнеров по межкультурной коммуникации.

РЕПОЗИТОРИЙ УО ВГАВМ

При межкультурном общении психологическая вероятность непонимания партнеров существенно возрастает. Непривычные манеры поведения, логика рассуждений, нарушение дистанции общения, типы одежды и т. п. могут вызывать негативные эмоции по отношению к партнеру и всей культуре, которую он представляет, и приводить к неудаче весь процесс общения. В этом случае у субъекта возникает неуверенность из-за неспособности предугадать ход процесса коммуникации и его результаты. Такое психологическое состояние человека в науке определяется как стресс.

Таким образом, наличие и преодоление «барьеров» в межкультурной коммуникации определяют и повышают уровень социокультурной компетентности личности, поскольку ставят ее перед необходимостью получения новых знаний о культуре партнеров, заставляют ее совершенствовать собственные коммуникативные навыки, развивать ее способность чувствовать особенности и менталитет чужой культуры.

УДК 616:995.121
КУЗИБОЕВ А.А., студент (Узбекистан)
Научный руководитель **Мурзалиев И.Дж**., д-р вет. наук, доцент
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия в етеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

ЭПИЗООТОЛОГИЯ ЭХИНОКОККОЗА ОВЕЦ

В условиях Узбекистана инвазионные болезни животных имеют тенденцию роста и наносят колоссальный экономический ущерб фермерским хозяйствам республики.

Эпизоотологическое обследование проводилось в трех фермерских хозяйствах Андижанской области Республики Узбекистан. Эхинококкоз встречается повсеместно, особенно в зонах интенсивно развитого животноводства. Заболеваемость животных зависит от условий содержания и кормления скота и от климатически-географических факторов местности. В период рыночной экономики идет свободная реализация домашних животных и продажа их продукций на рынках. В летние периоды усиливаются перемешивания больных и здоровых животных на отгонных пастбищах. В результате количество заболеваемости эхинококкозом животных увеличилось в 3-4 раза. Источниками гельминтов являются больные домашние животные, хищники (волк, лиса, песец, корсак, шакал, барсук, бобр, сурок, суслик), грызуны (крысы, мыши, змеи), птицы, а также зараженная почва, вода, корма, солнечная радиация. Также выяснили, что за последние 20 лет в хозяйствах Узбекистана и в пограничных районах Кыргызстана ветеринарные службы перестали заниматься отстрелом бродячих собак и кошек, диких хищников и недостаточно проводят противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия.

Эхинококкоз овец встречается повсеместно, независимо от возраста животных. Причиной распространения заболевания является несвоевременное проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий против гельминтов животных.

РЕПОЗИТОРИЙ УО ВГАВМ