УДК 619:616.1/636.2
ЧИСТЯКОВА А.А., студент (Российская Федерация)
Научный руководитель **Воинова А.А.**, канд. вет. наук, ассистент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ

Бронхопневмония является одной из наиболее часто встречающихся патологий у телят, особенно содержащихся большими группами на крупных животноводческих комплексах. Причинами развития болезни являются чаще всего нарушения зоогигиенических условий их содержания, такие как сквозняки, высокая влажность, низкая температура окружающей среды, пылевая загрязненность, а также слабая резистентность телят (чаще болеют телята-гипотрофики, как правило, полученные от больных кетозом или коров-матерей).

Цель исследования – определить терапевтическую и экономическую эффективность от применения сочетанного введения препаратов «Пневмостоп» и «Габивит-Se» при лечении телят, больных бронхопневмонией.

Исследование проводили в условиях ЗАО «Красносельское» Ленинградской области в 2017 году на телятах черно-пестрой голштинизированной породы. Происследовано все поголовье телят в хозяйстве в возрасте от 2 недель до 6 месяцев. Клинические признаки бронхопневмонии установлены у 13 животных. Основными признаками болезни являются одышка – телята дышат через рот, развивается полипноэ до 68 дых.движ./мин., наблюдали кашель, который усиливался при движениях животного (при усилении глубины дыхания), нередко отмечали серозно-слизистые и слизисто-гнойные или гнойные истечения из носовых отверстий, телята становились вялыми, аппетит снижался или отсутствовал. При измерении температуры тела наблюдали ее повышение, максимально этот показатель составлял 40,2 ^{0}С. Для лечения больных бронхопневмонией телят применяли антимикробный препарат «Пневмостоп» в дозе 20 мг действующего вещества на кг массы животного или 1 мл препарата на 15 кг, двукратно с интервалом 48 часов. Также больным телятам вводили витаминный комплекс «Габивит-Se» по 5-8 мл на инъекцию однократно. В результате лечения клинические признаки бронхопневмонии (кашель, одышка, полипноэ, гипертермия, отказ от корма и чрезмерная жажда) исчезали на 4-е сутки от первого дня лечения. Экономическая эффективность проведенного лечения составила 1,25 рублей на 1 рубль затрат.

Исходя из данной работы, можно заключить, что примененное лечение оказалось эффективным и может быть использовано при терапии телят, больных бронхопневмонией.

РЕПОЗИТОРИЙ УО ВГАВМ