Ученые записки ВВИ. - 1961. - Т. 17.

Кафедра акушерства (зав. кафедрой профессор Я. Г. ГУБАРЕВИЧ)

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У КОРОВЫ

В. М. ВОСКОБОЙНИКОВ, кандидат ветеринарных наук

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе появились сообщения, посвященные вопросу кесарева сечения у домашних животных. Однако наблюдений за отдаленными результатами после кесарева сечения в ветеринарной практике пока недостаточно. Анализируя имеющиеся в литературе сообщения о выполнении кесарева сечения у коров, можно сделать вывод, что оперированных животных, как правило, не осеменяют, а в лучшем случае используют до прекращения лактации, затем откармливают на мясо. Это и побудило нас сообщить о своих наблюдениях за отдаленными результатами кесарева сечения у коровы.

В 1957 г. в акушерскую клинику института была доставлена корова пяти лет нижесредней упитанности. На основании клинического исследования был установлен диагноз: перекручивание матки. Все попытки раскрутить ее оказались безуспешными, а поэтому мы сразу же приступили к операции — кесареву сечению, — которая выполнялась под поясничной эпидуральной анестезией. Лапаротомия осуществлена в правом подвздохе по линии маклок — пупок. Разрез матки сделан по большой кривизне на протяжении 25 см. После удаления околоплодных вод, извлечения мертвого плода, отделения последа, а также орошения матки дезинфицирующими растворами на ее рассеченную стенку наложили двухэтажный шов Лямбера. Матка была вправлена в брюшную полость и раскручена. На брюшную стенку наложен узловой трехэтажный шов.

Послеоперационное лечение проводилось антибиотиками и сульфамидными препаратами. На 18-й день корову выписали в хорошем состоянии.

Спустя 61 день после операции корову осеменили. Через два месяца у нее в оперированном роге была установлена двухмесячная беременность. Через девять месяцев после осеменения у коровы родилась живая телочка весом 23,5 кг. Послеродовой период протекал нормально. Через два месяца корову вновь осеменили. Ректальным исследованием через 60 дней установлена стельность. Вторая беременность, также как и первая, протекала без видимых изменений. Роды наступили в срок, родилась живая телочка весом 33 кг. Послед отделился через пять часов. С наступлением третьей охоты корова снова была осеменена и через два месяца у нее установили третью стельность.