

УДК 619:616-022

ЗЕЛЕНСКАЯ Я. В., магистр ветеринарной медицины

Сумская областная государственная лаборатория ветеринарной медицины

ШУШВАЛ В. В., студентка факультета ветеринарной медицины

Сумской национальной аграрный университет

РЕШЕТИЛО А.И., кандидат ветеринарных наук, доцент

Сумской национальной аграрный университет, Украина

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАКТЕРИАЛЬНОГО ОТИТА СОБАК

Отит - Otitis – группа воспалительных заболеваний внешнего, среднего и внутреннего уха. На сегодняшний день в ветеринарной практике бактериальный отит собак – проблемное заболевание. Недостаточно изучены вопросы этиологии бактериального отита, чувствительности возбудителей к антибиотикам, терапевтические схемы не всегда эффективны, очень часто наблюдается рецидив болезни.

Цель работы – установление этиологии бактериального отита собак в центральном микрорайоне г. Сумы.

Исследования проведены на базе клиники «Ветсервис» г. Сумы, бактериологического отдела Сумской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины.

Установлено, что отит у собак полиэтиологический. Наиболее часто регистрируется бактериальный отит. Так за 2006-2008 гг. зарегистрирован 181 случай отита бактериальной этиологии, что составляет 69,7%. Очень часто регистрируется бактериально-грибковый отит – 35 случаев (13,5%). Реже встречается грибковый отит – 18 случаев (6,9%), аллергический отит – 11 случаев (4,2%), паразитарный отит – 10 случаев (3,8%) и отит, вызванный травмами ушной раковины и наружного слухового прохода – 5 случаев (1,9%).

При изучении возбудителей бактериального отита собак нами установлено, что в большинстве случаев отит вызывали несколько возбудителей в ассоциации – 132 случая, что составляет 72,9%. В основном это стафилококки и стрептококки, которые выделены в 79 случаях (43,6%). Стрептококки, стафилококки и диплококки – 24 случая (13,3%). Реже выделяли стафилококки и диплококки – 16 случаев (8,8%), стафилококки и синегнойная палочка – 9 случаев (5%) и стафилококки и кишечная палочка – 4 случая (2,2%).

Значительно реже бактериальный отит собак вызывал один возбудитель – 49 случаев, что составляет 27,1%, стафилококк, выделенный в 23 случаях (12,7%), стрептококк – в 14 случаях (7,7%), синегнойная палочка – в 9 случаях (5,0%), кишечная палочка – в 3 случаях (1,7%).