

УДК 636.4 – 053.2.084.522.087.7

**СЕЦКО Е. А.**, студентка

Научный руководитель: **ЛЯХОВА Е. Н.**, ассистент

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БВМД ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ**

Чтобы сократить затраты кормов на производство свинины, требуется нарастить максимальную массу животных в молодом возрасте. Цель работы – изучение эффективности выращивания и откорма молодняка свиней при использовании комбикормов разного состава в филиале «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП» Речицкого района Гомельской области.

Для изучения продуктивных качеств животных при кормлении разными комбикормами на свиноводческом комплексе филиала был поставлен научно-хозяйственный опыт. Были отобраны две аналогичные группы поросят после отъема в 42 дня, по 25 голов в каждой группе. Кормление разных групп поросят осуществлялось полнорационными комбикормами СК-21 на доращивании и СК-26 на откорме. В состав комбикормов для первой группы вводили премикс, для второй группы – БВМД. Состав и качество комбикормов соответствовали нормативным данным.

К концу доращивания, в 90-дневном возрасте, поросята 2 группы весили в среднем 32,63 кг, больше, чем поросята 1 группы, на 1,11 кг или 3,5 %. А к концу откорма средняя живая масса животных этой группы составила 117,76 кг, и достоверная разница была 7,7 кг или 7 %.

Во все периоды опыта абсолютные и среднесуточные приросты были достоверно выше по группе поросят, которым скармливали комбикорма с БВМД. За период доращивания поросята второй группы набрали на 1,65 кг (или 9,1 %) больше, чем их сверстники из первой группы (18,10 кг). За период откорма абсолютный прирост животных второй группы (85,13 кг) превысил аналогичный показатель по первой группе на 6,59 кг (8,4 %). Разница в приростах за весь период доращивания и откорма между двумя группами составила 8,24 кг, или 8,5 %. По среднесуточному приросту закономерность была такая же.

Чем выше прирост, тем ниже расход корма на его получение. В нашем опыте за весь период затраты кормов по группе молодняка, потреблявшего комбикорм с БВМД (4,41 корм. ед.), были ниже на 7 %, чем у животных, которым скармливали комбикорма без добавок.

Таким образом, применение комбикорма с добавками БВМД в скармливании молодняка на доращивании и откорме оказало положительное влияние на прибавку в живой массе, среднесуточные приросты и затраты корма по сравнению с кормлением комбикормом, в состав которого был введен только премикс.