

**О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КЛИНИЧЕСКИХ  
И ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ПРИ КАЗУИСТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ  
МАТКИ У КОРОВЫ**

Доцент В. И. МАКСИМОВ  
Доцент В. М. ВОСКОВОЙНИКОВ  
Ассист. С. Н. ЧЕРЕДКОВ  
Ассист. В. В. КОНОПЛЕВ

Студ. 3 курса ветфака: СОЛОВЬЕВ Т. З. и ИОЩИК В. И.  
(Из кафедры акушерства, зав. кафедрой доцент  
В. И. Максимов)

1. Скручивание матки у животных довольно редкое заболевание. Наблюдается оно чаще у коров вследствие своеобразных особенностей связочного аппарата матки, в силу которых матка остается в брюшной полости недостаточно зафиксированной. Непосредственными причинами скручивания матки являются резкие движения и падения животного. Болезнь проявляется выраженным беспокойством, потугами, схватками и другими признаками, напоминающими явления колик.

При вагинальном исследовании обнаруживаются характерные спиралеобразные складки слизистой оболочки. При ректальном исследовании находят различной степени натяжения маточных связок и спиралеобразное перекручивание в области влагалища и шейки матки.

Исход болезни при несвоевременном вмешательстве обычно неблагоприятный в связи с нарушением кровообращения и последующим некрозом матки.

2. Наблюдаемый нами случай перекручивания матки, спустя 13 дней от начала родов, не имел характерных клинических признаков перекручивания. При вагинальном исследовании спиралеобразных складок не обнаружено, канал шейки матки почти полностью закрыт. Симптомы родов отсутствовали.

Единственным признаком на установление диагноза явилось, обнаруженное ректально, неравномерное натяжение связок, наличие небольшого перехвата—сужения в области тела матки и сильное напряжение ее стенок.

В виду невозможности извлечения плода через закрытый канал шейки матки и наличия признаков развивающегося септического состояния, животное было подвергнуто вынужденному забою. При разделке туши диагноз на перекручивание матки полностью подтвердился. Установлено перекручивание матки на  $360^\circ$  в области ее тела. Видимых признаков омертвления стенок матки не обнаружено. Карункулы на всей поверхности матки подверглись мацерации и отторжению. Плод неразложившийся.

3. Разбираемый нами случай является атипичным и представляет определенный интерес для акушерской практики. Его особенностью является: длительность течения болезни, отсутствие характерных клинических признаков, отсутствие явлений некроза матки.

---