АССОЦИАТИВНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЛЕПТОСПИРОЗА И БАБЕЗИОЗА У СОБАК

Зон Г.А., Решетило А.И... Зубко Н.В
Сумский государственный аграрный университет, Украина

При обследовании больных лептоспирозом собак в центральном районе г. Сумы установлено, что в 12 случаях заболевание протекало ассоциативно с бабезиозом. Среди клинических признаков доминировали анорексия, угнетение, гемоглобинурия, наличие зловонного запаха из пасти. Лихорадка, иктеричность и другие симптомы были непостоянными. Во всех случаях заболевание протекало в крайне тяжелой форме.

Окончательно диагноз устанавливали гематологически и серологически при обнаружении бабезий и диагностических титров на лептоспироз в РМА.

При одновременном применении беренила и стрептомицина на фоне специфической и дезинтоксикационной терапии не всегда удавалось избежать нефротоксического воздействия как токсинов паразитов, так и препаратов

Животные впадали в коматозное состояние и некоторые погибали, несмотря на оказание всесторонней медикаментозной помощи. Непосредственная гибель наступала в большинстве случаев от отека легких, осложненного глубокой дистрофией печени и почек. Другие изменения (кровоизлияния, инфаркты, эрозии, язвы, иктеричность, катары) встречались редко или отсутствовали.

Таким образом, ассоциативное течение лептоспироза и бабезиоза характеризовалось выраженными токсико-инфекционными явлениями с нередко атипичной картиной и отсутствием ряда патогномоничных признаков, свойственных обоим заболеваниям.

Быстрое развитие глубоких интоксикационных процессов не позволяет в ряде случаев с успехом осуществить комплексную специфическую, дезинтоксикационную, патогенетическую, этиотропную и другие виды терапевтического воздействия.

СМЕШАННЫЕ ИНФЕКЦИИ В ОВЦЕВОДСТВЕ

Кадымов Р.А.
Азербайджанская сельскохозяйственная академия, г. Гянджа

В практике овцеводства часто встречаются инфицирование животных несколькими видами возбудителей Это подтверждается нами при обследовании овец ряда хозяйств.

В овцеводческих фермах Самухского района ягнята болели с симп-