Материалы учредительной конференции Международной ассоциации паразитоценологов, г. Витебск, 23-24 сентября 1999 г. - Витебск : ВГАВМ, 1999.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЛЯМБЛИОЗА В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Станку М., Лунгу В.
Национальный научно-практический центр профилактической медицины, Республика Молдова, г. Кишинев

Лямблиоз - широко распространенное заболевание, приносящее ущерб здоровью детского населения. Эпидемиология этой инвазии в Республике Молдова не изучена, из-за чего затруднена успешная профилактика и борьба с ней. В настоящем сообщении приводятся результаты по некоторым аспектам эпидемиологии лямблиоза у организованных детей сельской местности.

В августе-октябре комплексному копропаразитологическому обследованию подвергнуто 527 детей из сельской местности (центральная зона республики), в том числе дошкольников - 309 и школьников начальных классов - 218. Использовались следующие методы исследования: Калантаряна, Вруипта, Рабиновича, мазки окрашенные раствором Люголя и методом Циля-Нильсена

Результаты исследований показали, что в общем пораженность лямблиозом составила 15,4%, среди дошкольников - 20,7%, школьников - 7,8%. Среди выявленных кишечных простейших лямблии занимают первое место. Инвазия с низкой, средней и высокой интенсивностью зарегистрирована в 53,0% , 17,3% 29,6% случаев соответственно. Среди дошкольников младших, средних и старших групп уровень пораженности лямблиозом составил соответственно 20,4, 8,2 и 21,4%. В пределах этих групп показатель колебался соответственно: от 10,0 до 27,6%, от 0,0 до 22,2% и от 18,3 до 31,6%. Резкие колебания пораженности по группам объясняются и различным уровнем соблюдения санитарно-гигиенического режима. В группах установлен параллелизм между пораженностью лямблиозом и энтеробиозом, свидетельствующий об общем механизме передачи при этих инвазиях.

В 60,5% случаев лямблии выявлены в ассоциации с разными видами кишечных простейших и гельминтов, наибольший удельный вес имеют ассоциации с Enterobius vermicularis (28,6%), Entamoeba coli (14,3%), Emb. Intestinalis (14,3%) и Cr. parvym (6,1%).

Следовательно, лямблиоз в виде моно- и полиинвазии широко распространен среди детей в сельской местности, в особенности среди детей младших и старших групп дошкольных учреждений. Успешная борьба с этой инвазией возможна при проведении комплекса мероприятий санитарно-гигиенического и эпидемиологического характера.