

УДК 636.2.053.084

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ПИТАНИЯ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА

Шаура Т.А.УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Витебск, Республика Беларусь

Применение повышенного уровня кальция и фосфора в рационах племенных бычков молочного периода относительно норм РАСХН (2003) оказало положительное действие на скорость роста, биохимические показатели крови и резистентность молодняка.

Application of the raised level of calcium and phosphorus in diets of breeding bull-calves of the milk period concerning norms of Russian Academy of Agrarian Sciences (2003) has had positive an effect on growth rate, biochemical indicators of blood and resistance of calves.

Введение. Общеизвестно, что обеспечение максимальной генетически обусловленной продуктивности, сохранения здоровья и высоких воспроизводительных качеств возможно лишь при удовлетворении потребности животных во всех элементах питания [1, с. 18]. Зная закономерности индивидуального развития организма, теми или иными условиями кормления и содержания можно направлять обмен веществ в нужную сторону, изменяя природу самого организма в пределах, заложенных генетикой, и тем самым получать животных с определенными качествами [2, с. 3]. Целью выращивания племенных бычков является получение крепких здоровых животных с плотной конституцией, хорошим экстерьером, с высокой воспроизводительной способностью, возможностью длительного использования, начиная с 14-15-ти месячного возраста [2, с. 105]. Поэтому кормление племенного молодняка крупного рогатого скота, начиная с первых месяцев жизни, должно не только обеспечивать высокую скорость роста, но и способствовать формированию крепкого костяка, плотной мускулатуры и поддержанию высокой резистентности организма.

Наряду с основными компонентами питания исключительно важную роль в формировании и поддержании крепкого здоровья, обеспечении пищеварительных процессов, высокой продуктивности, развития и функционирования репродуктивных органов, регуляции приема корма и воды играют минеральные вещества [3, с. 6, 8]. Они должны поступать в организм животного с кормом, обеспечивая нормальный обмен веществ и энергии, образование ферментов, гормонов и тканей. Растущие животные используют значительную часть минеральных веществ для построения тканей и органов. Так, телята расходуют на эти цели 35-60 г зольных элементов в сутки [4].

Важнейшими макроэлементами для организма животного являются кальций и фосфор, которые составляют до 70% массы всех минеральных веществ, находящихся в теле животного [6, с. 13]. Основная часть кальция организма содержится в костяке (около 99%). Костная ткань является своеобразным депо этого элемента, которое находится в динамическом равновесии с кальцием кровеносной системы и служит буфером для поддержания стабильного уровня его циркуляции [5, с. 116, 7]. Несмотря на то, что только около 1% кальция содержится вне костяка, он является важным компонентом большинства клеток и тканевых жидкостей. Кальций активизирует ферментную систему, благоприятно влияет на обмен железа и устраняет вредное воздействие избытка солей калия, магния, натрия и др. Ионы кальция укрепляют защитные функции организма, понижая клеточную проницаемость и повышая фагоцитарную активность лейкоцитов [3, с. 23-24, 9, с. 245]. Фосфор присутствует постоянно во всех органах и тканях организма. По сравнению с кальцием он биологически более активен: 83-85% его содержится в скелете и 15-17% – в остальных тканях. Все виды обмена веществ – белковый, углеводный, нуклеиновый, липидный, минеральный и энергетический – так или иначе связаны с обменом фосфора [3, с. 25, 10, с. 264]. У телят на 1 кг прироста приходится около 12-16 г кальция и 7-9 г фосфора. Поступать эти вещества должны в значительно больших количествах, так как утилизируются они в организме лишь на 30-40% [11, с. 221].

Отечественными и зарубежными учеными проведены исследования по пересмотру норм минерального питания молодняка крупного рогатого скота, в результате которых установлено положительное влияние увеличения уровня различных минеральных веществ на здоровье и продуктивные качества животных [2, с. 118-121, 12]. Однако нормы таких важных элементов, как кальций и фосфор, в кормлении племенных бычков молочного периода не пересматривались, хотя они были разработаны для обширной территории бывшего Советского Союза, где природно-экономические условия в разных регионах могут сильно отличаться от среднестатистических по стране и не позволяют учитывать все особенности кормов Беларуси [2, с. 118]. Поэтому целью нашей работы было установить влияние повышенного уровня кальция и фосфора в рационах племенных бычков молочного периода на их продуктивность и резистентность.

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть работы выполнена в условиях РСУП «Племзавод Кореличи» Кореличского района Гродненской области на племенных бычках 1-6-ти месячного возраста. Согласно проведенной схеме (табл. 1) были проведены два научно-производственных опыта (в зимний и летний периоды), продолжительностью 180 и 183 дня соответственно. В каждом опыте были сформированы по три группы бычков 1-месячного возраста по 10 голов в каждой, с учетом генотипа и живой массы. Подопытные животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. В начале опытов был проведен зоотехнический анализ кормов, на основании которого каждой группе, дополнительно к основному рациону, в смеси с концентратами вводили мел и монокальцийфосфат. При этом животные I контрольной группы получали кальций и фосфор в соответствии с нормами РАСХН (2003), II группы – на 10%, III – на 20% больше указанных норм. Кроме того, рационы были сбалансированы по микроэлементам в соответствии с нормами РАСХН (2003) путем введения солей микроэлементов, по которым наблюдался дефицит.

Динамику живой массы бычков молочного периода и ее прирост изучали путем индивидуального взвешивания в начале опыта и ежемесячно до его окончания. По результатам взвешивания определяли среднесуточный прирост.

Таблица 1 – Схема опытов

Группы	Кол-во бычков в группе (n)	Продолжительность опыта, дней	Условия кормления бычков
I-контрольная	10	180	Основной рацион (ОР) + мин. добавки (Са и Р по нормам РАСХН)
II-опытная	10		ОР + мин. добавки (норма РАСХН +10% Са и Р)
III-опытная	10		ОР + мин. добавки (норма РАСХН +20% Са и Р)

Для исследования в начале и конце каждого опыта у 5-ти животных из каждой группы были отобраны пробы крови, анализ которых проводили в биохимическом отделе НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО ВГАВМ по общепринятым методикам. В сыворотке крови определяли общий белок и его фракции (альбумины и α -, β -, γ -глобулины) – рефрактометром ИРФ-22; витамины А и Е – на флюорате-02М, кальций – колориметрическим методом с о-крезолфталеином, неорганический фосфор – колориметрическим методом с молибдат-ионами без депротеинизации, магний – нефелометрическим методом с EGTA, активность щелочной фосфатазы – кинетическим методом на автоматическом биохимическом анализаторе «Eurolyser».

В стабилизированной крови определяли гемоглобин и эритроциты с использованием автоматического гематологического анализатора клеток «Abacus junlor vet».

Фагоцитарную активность лейкоцитов определяли по В.И. Гостеву, лизоцимную активность сыворотки крови – по В.Г. Дорофейчуку, бактерицидную активность сыворотки крови – по Мюнселю и Треффенсу в модификации О.В. Смирновой и Т.А. Кузминой.

Цифровой материал обработан статистически на персональном компьютере с помощью ПП Exsel.

Результаты исследований. Одним из важнейших показателей, характеризующих степень развития животных, является живая масса (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика живой массы и среднесуточных приростов подопытных бычков

Группа	Живая масса в начале опыта, кг	Живая масса в конце опыта, кг	Валовой прирост, кг	Среднесуточный прирост		Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед.
				граммов	в % к контролю	
Летний период						
I	31,5±0,33	201,3±1,25	169,8	922,8±12,1	100	4,12
II	31,6±0,25	204,4±0,74*	172,8	939,2±13,3*	101,7	4,06
III	31,8±0,25	208,3±1,3**	176,5	959,2±13,2**	103,9	4,04
Зимний период						
I	32,0±0,8	197,4±1,5	165,4	918,9±13,2	100	4,15
II	31,7±1,0	200,6±2,1	168,9	938,3±12,4	102,1	4,08
III	31,9±0,8	204,2±2,4*	172,3	957,2±11,7*	104,2	4,06

Примечание: * – $P < 0,05$, ** – $P < 0,01$

Результаты летнего научно-производственного опыта показали, что в начале исследований живая масса бычков была приблизительно одинаковой и колебалась в пределах 31,5-31,8 кг. В конце опыта наблюдались значительные различия живой массы подопытных животных по группам. Так, средняя живая масса бычков II опытной группы составила 204,4 кг, что на 3,1 кг, или на 1,5% ($P < 0,05$) выше по сравнению с животными контрольной группы. Данный показатель в III группе составил 208,3 кг, что на 7 кг или 3,5% ($P < 0,01$) выше по сравнению с результатом, полученным в контрольной группе. При этом животные III группы превосходили животных II группы на 3,9 кг, или 1,9%. Бычки II и III опытных групп превосходили животных I группы по среднесуточному приросту за период проведения опыта соответственно на 16,4 г и 36,4 г.

Затраты кормов на 1 кг прироста во II и III группах составили 4,06 и 4,04 корм. ед., или на 1,5-2% ниже по сравнению с первой группой. В зимний период динамика живой массы и среднесуточных приростов была следующей: если в начале опыта живая масса бычков была 31,7-32,0 кг, то в конце опыта она возросла по группам до 197,4-204,2 кг. При этом среднесуточный прирост по сравнению с I-контрольной группой был выше во II группе на 2,1%, в III группе – на 4,2% ($P < 0,05$). Затраты кормов на 1 кг прироста во II и III группах составили 4,08 и 4,06 корм. ед. или на 1,7-2,2% ниже по сравнению с I контрольной группой.

Таким образом, повышенный уровень кальция и фосфора в рационах племенных бычков молочного периода положительно повлиял на скорость роста подопытных животных. При этом как в летний, так и в зимний периоды самыми высокими показателями отличались бычки III группы, в рационе которых норма данных элементов была увеличена на 20% по сравнению с нормами РАСХН (2003).

Скармливание рационов с повышенным уровнем кальция и фосфора не оказало отрицательного воздействия на клинические показатели крови подопытных животных. Результаты гематологических исследований представлены в таблице 3.

В опыте, проведенном в летний период, по всем показателям анализа крови бычки II и III опытных групп превосходили аналогов I группы, при этом по содержанию эритроцитов – на 4,1 и 8,1%, гемоглобина – на 3,2 и 6,3%, резервной щелочности – на 9,4 и 12,2%, количеству общего белка крови – на 4,1 и 11,7%, альбуминов – на 1,6 и

3,1%, γ -глобулинов – на 3, 2 и 6,7% соответственно. При этом разница по указанным показателям между контрольной группой и III опытной была достоверна при $P < 0,05$.

Кроме того, повышенный уровень кальция и фосфора в рационах бычков благоприятно отразился на минеральном обмене. Так, в крови молодняка II и III групп содержание кальция было выше на 5,8 и 7, 9% ($P < 0,05$), фосфора – на 9,7 и 16,1% ($P < 0,05$), а активность щелочной фосфатазы ниже на 11,3 и 20,8% ($P < 0,05$) соответственно по сравнению с контролем.

Таблица 3 – Показатели крови племенных бычков в конце опыта

Показатели	Группы	Периоды опытов			
		летний		зимний	
		количество	в % к контролю	количество	в % к контролю
Эритроциты, $10^{12}/л$	I	6,82±0,12	100	6,78±0,20	100
	II	7,10±0,33	104,1	7,40±0,30	109,1
	III	7,37±0,16*	108,1	7,53±0,2*	111,1
Гемоглобин, г/л	I	104,8±2,20	100	103,8±1,3	100
	II	108,2±2,58	103,2	107,3±1,3	103,4
	III	111,4±1,51*	106,3	108,7±1,4*	104,7
Резервная щелочность, ммоль/л	I	427±13,0	100	420,5±11,0	100
	II	467±14,0	109,4	454,8±10,8*	108,2
	III	479±15,0*	112,2	463,0±10,1*	110,1
Общий белок, г/л	I	68,5±2,11	100	68,0±2,0	100
	II	71,3±3,01	104,1	73,4±3,0	107,9
	III	76,5±1,97*	111,7	75,2±1,8*	110,6
Альбумины, %	I	42,5±0,30	100	42,8±0,47	100
	II	43,2±0,15	101,6	44,0±0,40	102,8
	III	43,8±0,3*	103,1	45,1±0,53*	105,4
γ -глобулины, %	I	25,3±0,42	100	24,0±0,53	100
	II	26,1±0,31	103,2	26,4±0,72*	110,0
	III	27,0±0,40*	106,7	27,3±0,87*	113,8
Активность щелочной фосфатазы, нкат/л	I	2033,4±109,7	100	2156,6±91,4	100
	II	1804,2±121,3	88,7	1923,6±106,8	89,2
	III	1609,6±125,1*	79,2	1789,4±106,3*	83,0
Кальций, ммоль/л	I	2,78±0,08	100	2,75±0,07	100
	II	2,94±0,19	105,8	2,91±0,08	105,8
	III	3,00±0,06*	107,9	2,98±0,05*	108,4
Фосфор, ммоль/л	I	1,43±0,06	100	1,49±0,06	100
	II	1,57±0,09	109,7	1,61±0,04	108,1
	III	1,66±0,07*	116,1	1,68±0,04*	112,8
Магний, ммоль/л	I	1,08±0,05	100	1,09±0,03	100
	II	1,15±0,02	106,5	1,17±0,02	107,3
	III	1,19±0,01	110,2	1,18±0,04	108,3
Витамин Е, мкмоль/л	I	5,27±0,25	100	5,44±0,15	100
	II	5,57±0,19	105,7	5,68±0,23	104,4
	III	5,43±0,23	103,0	5,81±0,25	106,8
Витамин А, мкмоль/л	I	1,54±0,13	100	1,33±0,10	100
	II	1,58±0,14	102,6	1,38±0,08	103,8
	III	1,66±0,15	107,8	1,43±0,02	107,5

Примечание: * – $P < 0,05$

В зимний период выявлена аналогичная тенденция превосходства показателей крови опытных групп над контролем. Животные II опытной группы в 6-месячном возрасте превзошли молодняк I контрольной группы по содержанию в крови эритроцитов, гемоглобина, резервной щелочности, общего белка, альбуминов и γ -глобулинов на 9,1%, 3,4, 8,2 ($P < 0,05$), 7,9, 2,8 и 10% соответственно. Бычки III опытной группы превзошли контрольных животных по содержанию эритроцитов на 11,1%, гемоглобина – на 4,7%, резервной щелочности – на 10,1% общего белка – на 10,6%, альбуминов – на 5,4% и γ -глобулинов – на 13,8% при достоверной разнице ($P < 0,05$).

В крови молодняка II и III групп содержание кальция было выше на 5,8 и 8,4% ($P < 0,05$) и фосфора – на 8,1 и 12,8% ($P < 0,05$) соответственно по сравнению с аналогами контрольной группы. В 6-ти месячном возрасте активность щелочной фосфатазы в крови бычков II опытной группы была ниже на 10,8%, III группы – на 17,0% ниже, ($P < 0,05$), чем у аналогов I контрольной группы. Это свидетельствует о более интенсивной минерализации костяка бычков II и III опытных групп по сравнению с контролем.

При изучении влияния различных уровней кальция и фосфора в рационах ремонтных бычков молочного периода на показатели естественной резистентности в летний период было установлено (табл. 4), что животные II и III опытных групп превзошли животных контрольной группы по всем представленным показателям в 6-ти месячном возрасте: по лизоцимной активности сыворотки крови – на 0,9 и 1,6%, по бактерицидной активности сыворотки крови – на 2,9 и 8,5%, и по фагоцитарной активности лейкоцитов крови – на 2,6 и 2,8%. Однако разница по всем показателям не выходила за пределы достоверной границы случайных колебаний.

Таблица 4 – Показатели естественной резистентности племенных бычков

Группа	ЛАСК, %		БАСК, %		ФАЛ, %	
	начало опыта	конец опыта	начало опыта	конец опыта	начало опыта	конец опыта
Летний период						
I	4,46±0,28	6,10±1,64	53,8±4,77	59,7±2,76	53,0±2,43	58,7±2,41
II	4,52±0,29	7,00±1,52	54,7±2,52	62,6±1,40	52,7±3,00	61,3±2,95
III	4,54±0,27	7,73±1,23	53,8±5,09	68,2±2,78	51,1±2,80	61,5±2,51
Зимний период						
I	4,32±0,33	5,74±0,54	52,16±2,80	59,12±1,68	49,34±2,10	59,14±2,08
II	4,40±0,59	6,92±0,51	52,10±3,58	63,02±1,80	49,20±2,36	63,40±1,59
III	4,28±0,60	7,24±0,65	51,66±4,18	64,28±1,91	50,20±3,50	66,00±1,96*

Примечание: * – $P < 0,05$

В опыте, проведенном в зимний период, установлено, что животные, имевшие повышенный уровень кальция и фосфора в рационах относительно норм РАСХН (2003), в конце опыта превзошли животных контрольной группы по всем представленным показателям. Так, у бычков II и III опытных групп лизоцимная активность сыворотки крови была выше на 1,2 и 15%, бактерицидная активность – на 3,9 и 5,2% и фагоцитарная активность лейкоцитов крови – на 4,3 и 6,9% ($P < 0,05$) по сравнению с аналогами I группы.

На основании полученных результатов можно отметить, что увеличение уровня кальция и фосфора в рационах племенных бычков молочного периода положительно повлияло на показатели естественной резистентности молодняка как в летний, так и в зимний период. Это можно связать с влиянием этих элементов на проницаемость клеточных и внутриклеточных лизосомных мембран, активацией кальцием ряда клеток иммунной системы и способности его повышать фагоцитарную активность лейкоцитов.

Закключение. Таким образом, применение повышенного на 20% относительно норм РАСХН (2003) уровня кальция и фосфора в рационах племенных бычков молочного периода в летний и зимний периоды способствует повышению среднесуточных приростов живой массы молодняка на 3,9-4,2%, увеличению показателей естественной резистентности и благоприятно влияет на морфологический и биохимический состав крови.

Литература. 1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справ. пособие / А.П. Калашников [и др.]. – Москва, 2003. – 456 с. 2. Выращивание молодняка крупного рогатого скота: Монография / В.И. Шляхтунов [и др.]. – Витебск, 2005. – 184 с. 3. Кучинский, М.П. Биоэлементы – фактор здоровья и продуктивности животных : монография / М.П. Кучинский. – Минск : Бизнесофсет, 2007. – 372 с. 4. Влияние минеральных добавок из местных источников сырья на эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота / А.Н. Кот [и др.] // Сб. науч. тр. / УО ВГАВМ. – Витебск, 2010. – Т. 46. – Вып. 1. – Ч. 2: Ученые записки УО ВГАВМ. – С. 157-160. 5. Хохран, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных / С.Н. Хохран. – Москва: КолосС, 2004. – 692 с. 6. Подобед, Л.И. Руководство по кальций-фосфорному питанию сельскохозяйственных животных и птицы / Л.И. Подобед. – Одесса, 2005. – 410 с. 7. Ланцов, А.В. Влияние монокальцийфосфата и микроэлементов в рационе племенных бычков на их рост, качество и количество спермопродукции / Л.И. Ланцов // Сб. науч. тр. / УО ВГАВМ. – Витебск, 2010. – Т. 46. – Вып. 1. – Ч. 2: Ученые записки УО ВГАВМ. – С. 164 - 167. 8. Колунов, Ю.А. Роль макроэлементов в жизнедеятельности животных / Ю.А. Колунов, В.А. Яковлев, А.В. Обухов // Сельскохозяйственный практикум. – 2000. – №2. – С. 12-18. 9. Пономаренко, Ю.А. Корма, кормовые добавки и продукты питания : монография / Ю.А. Пономаренко. – Минск : Экоперспектива, 2010. – 736 с. 10. Зайцев, С.Ю. Биохимия животных. Фундаментальные и клинические аспекты: учебник / С.Ю. Зайцев, Ю.В. Конопатов. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2004. – 384 с. 11. Пестис, В.К. Кормление сельскохозяйственных животных: учеб. пособие. / В.К. Пестис, А.П. Солдатенко. – Минск: Ураджай, 2000. – 335 с. 12. Невар, А.А. Влияние премиксов с различным уровнем минеральных веществ и витаминов на интенсивность роста ремонтных бычков в молочный период // Зоотехническая наука Беларуси: сборник научных трудов / НПЦ НАН Беларуси по животноводству. – Жодино, 2006. – Т.41. – С. 181-186

Статья передана в печать 3.01.2011 г.

УДК 636.2.085.16

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА БАВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ И РЕЗИСТЕНТНЫХ КАЧЕСТВ ТЕЛЯТ

Шейграцова Л. Н.

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»

г. Жодино, Республика Беларусь

В статье отражены результаты комплексного применения биологически активных веществ телятам в раннем онтогенезе. Установлено положительное влияние на интенсивность роста и развития подопытных животных, сопровождающееся увеличением живой массы, среднесуточного и относительного приростов; уровень морфо-биохимических показателей, гуморальных факторов защиты и иммунологической реактивности организма животных.

The article reflects the results of the integrated application of biologically active substances calves in early ontogeny. The positive effect on the rate of growth and development of experimental animals, accompanied by an increase in body weight, average daily and the relative increase, the level of morphological and biochemical parameters of humoral defense factors and immunological reactivity of animals.

Введение. В современных условиях выращивания крупного рогатого скота увеличение продуктивности и неспецифической резистентности является актуальным. В хозяйствах проводится ряд мероприятий, направленных на сохранение здоровья молодняка. Это является первоочередной задачей и требует особого внимания именно в начальный период развития, поскольку доказано, что чем лучше этот период будет протекать, тем лучше будут показатели прироста и продуктивности в дальнейшем [3].