

УДК 31:616.3:636.7

ЗИМИНА Е., студент (Российская Федерация)

Научный руководитель **Ковалев С.П.**, д-р вет наук, профессор

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У СОБАК

Для проведения исследования отбирали собак, поступавших в клинику с симптомами заболеваний органов пищеварения. Среди них по результатам клинических, инструментальных и лабораторных исследований выделили группу животных с установленным диагнозом «гастрит». Материалом служили собаки различных пород и возрастов с подтвержденным диагнозом «гастрит».

В течение года в ветеринарную клинику «Яково ветеринарный центр» обратились владельцы 5427 собак. У 1320 (24,3%) собак при клиническом осмотре и сборе анамнеза были обнаружены симптомы поражения органов желудочно-кишечного тракта (рвота, понос, отказ от еды и др.). Рвота была зарегистрирована у 1119 собак. Среди них инфекционные поражения (главным образом парвовирусный энтерит) были установлены в 32 случаях. Невоспалительные заболевания органов ЖКТ (острая кишечная непроходимость; нарушения моторики пищевода, желудка; отравления) были зарегистрированы у 319 собак из 1119 с проявлениями рвоты. Воспалительные заболевания желудка (гастриты), язвы и эрозии составили 614 случаев (46,5% от всех обращений с симптомами поражения ЖКТ). Подтвержденные случаи хронического гастрита составили 8,6% (114 животных), острого гастрита – 17,2% (228 животных) в общем количестве обнаруженных фактов желудочно-кишечных расстройств у собак. Возраст собак, страдающих гастритом, колебался в широких пределах (от 5 месяцев до 11 лет). В возрастной структуре заболевания незначительно преобладала группа молодых животных (возраст от 1 до 3 лет). В группе исследуемых животных менее 1 года было 34 (7,9%). Чаще всего гастрит отмечали у животных в возрасте 1-3 года и 3-6 лет: 140 (32,5%) и 129 (29,8%) случаев соответственно. У собак более старшего возраста заболевание встречалось реже - 110 (25,4%) случаев среди животных от 6 до 9 лет и 19 (4,4%) случаев у животных старше 9 лет. Вероятно, что возрастная структура заболеваемости гастритом у взрослых собак соответствует общей статистике обращений животных в клинику и не отражает объективной зависимости заболевания от возраста. Истинную заболеваемость гастритом щенков младше 5 месяцев трудно оценить, т.к. в этом возрасте поражение желудка часто имеет вторичный характер при различных инфекциях. Изменение рациона, разные сроки отъема от суки, условия содержания, вакцинации и дегельминтизации в этой группе животных также не позволяют провести объективные исследования на частоту встречаемости гастрита.