

ЗМЯНЕННІ ЎТРЫМАННЯ Ў КРЫВІ ЯГНЯТАК ЭРЫТРАЦЫТАЎ, ЛЕЙКАЦЫТАЎ І ГЕМАГЛАБІНУ ПРЫ РЭСПІРАТОРНЫХ ХВАРОБАХ

Уводзіны. Хваробы органаў дыхання (рэспіраторныя хваробы) досыць часта рэгіструюцца ў маладняку авечак у розных краінах свету і чыняць значную эканамічную шкоду [1, 2]. Важным этыялагічным фактарам пры дадзеных хваробах выступаюць розныя мікраарганізмы [2-4]. У сувязі з гэтым вядучым сродкам этыятропнай тэрапіі робяцца розныя антымікробныя прэпараты. Аднак іх ужыванне не заўсёды дазваляе забяспечыць поўнае акрыянне жывёлы і ўзнаўленні яго гаспадарчай каштоўнасці.

У сувязі з гэтым мэтай нашых даследаў стаў пошук шляхоў павышэння эфектыўнасці лячэбных мерапрыемстваў пры запаленчых рэспіраторных хваробах ягнятак на падставе ацэнкі змяненняў шэрагу паказчыкаў крыві.

Матэрыялы і метады даследванняў. Ва ўмовах фермерскай гаспадаркі (Рэспубліка Узбекістан) былі сфарміраваны тры групы ягнятак ва ўзросце 15-40 дзён (па 10 жывёл у кожнай групе). У склад першай групы былі ўключаны клінічна здаровыя ягняты, у склад другой групы – ягняты клінічна здаровыя, пасля праведзенага лячэння пры бронхіце і бронхапнеўманіі, у склад трэцяй – клінічна хворыя ягняты з сімптомамі рэспіраторнай паталогіі запаленчага характару (бронхіта і бронхапнеўманіі). Лячэбныя мерапрыемствы ў ягнят другой і трэцяй груп засноўваліся на курсавым ужыванні антыбактэрыяльных і нестэроідных супрацьзапаленчых прэпаратаў. Групы фармаваліся па меры захворвання і акрыяння ягнятак. Крытэрыем іх акрыяння было знікненне клінічных прыкмет хвароб (як было прынята ў гаспадарцы).

Ва ўсіх ягнятак былі адабраныя ўзоры крыві, у якой падлікам у камеры Гараева вызначалі ўтрыманне эрытрацытаў і лейкацытаў, а геміглабінцыянідным метадам – канцэнтрацыю гемаглабіну.

На падставе праведзеных даследаванняў было зроблена заключэнне аб тэрапеўтычнай эфектыўнасці выкарыстаных лячэбных схем і неабходнасці пашырэння спектра комплексных лячэбных мерапрыемстваў.

Лічбавы матэрыял эксперыментаў апрацаваны статыстычна з выкарыстаннем праграмы Statistica 7.0 зыходзячы з узроўня значнасці 0,05. Пры статыстычнай апрацоўцы разлічвалі сярэдняю арыфметычную ($\bar{X}$), стандартнае адхіленне (σ), дакладнасць адрозненняў паміж мноствамі дадзеных (p), ужываючы непараметрычны крытэрыі Мана-Уітні.

Вынікі даследванняў. Было вызначана, што ўтрыманне ў крыві здаровых ягнятак эрытрацытаў, лейкацытаў і гемаглабіну знаходзілася ў межах нарматыўных значэнняў. У якасці такіх паказчыкаў былі прыняты наступныя значэнні: $12,0-18,0 \times 10^{12}/л$ (для эрытрацытаў), $8,0-17,0 \times 10^9/л$ (для лейкацытаў) і $90-135 г/л$ (для гемаглабіну) [5]. Пры гэтым узровень эрытрацытаў у крыві ягнятак і другой, і трэцяй груп быў статыстычна значна ніжэй (на 17,0 і 17,4%) адпаведна. Канцэнтрацыя гемаглабіну ў крыві здаровых жывёл таксама статыстычна значна перавышала яго ўзровень у крыві жывёл другой і трэцяй груп (на 13,5 і 18,5% адпаведна). Дададзеныя змены могуць характарызаваць недастатковую нармалізацыю функцыі чырвонага косткавага мозгу пасля перахворвання і ў працэсе развіцця рэспіраторных хвароб.

Узровень лейкацытаў у крыві ягнятак першай групы, наадварот, стаўся істотна ніжэйшым, чым у жывёл другой і трэцяй груп (на 18,6 і 35,8% адпаведна). Вызначаныя адрозненні таксама былі статыстычна значнымі. Выяўленне падобных зменаў можа паказваць на захаванне запаленчых змяненняў у арганізме ягнятак наогул і ў бронхалёгчайнай

сістэме ў прыватнасці. І калі ў ягнятак трэцяй групы дадзеная тэндэнцыя заканамерная, то ўдругой групе яна характарызуе няпоўнае акрыянне жывёл пасля праведзенага лячэння, а таксама на яго магчымую нізкую тэрапеўтычную эфектыўнасць.

Заклучэнне. Праведзеныя намі даследванні паказалі, што адсутнасць клінічных прыкмет у ягнятак пасля заканчэння правядзення лячэбных мерапрыемстваў пры рэспіраторных хваробах, не з'яўляецца крытэрыем іх поўнага акрыання. Захаванне ў крыві жывёл зменаў, якія характарызуюць няпоўнае выкараненне запаленчых працэсаў і аднаўленне функцыянальнай актыўнасці чырвонага косткавага мозгу, паказвае на недастаткова высокую эфектыўнасць тэрапеўтычных мерапрыемстваў. Павышэнне іх эфектыўнасці можа заключацца ва ўключэнні ў схемы комплекснай тэрапіі пры рэспіраторных хваробах ягнятак лячэбных сродкаў, дазваляючых стымуляваць абменныя працэсы, павысіць імунную рэактыўнасць і натуральную рэзістэнтнасць у арганізме.

Літаратура. 1. *Pneumonic lesions in lambs in New Zealand: patterns of prevalence and effects on production* / K.A. Goodwin, R. Jackson, C. Brown, P.R. Davies, R.S. Morris, N.R. Perkins // *New Zealand Veterinary Journal*. – 2004. – Vol. 52, №4. – P. 175-179. 2. *Treatment of bacterial respiratory infections in lambs* / A.P. Politis, N.G.C. Vasileiou, K.S. Ioannidi, V.S. Mavrogianni // *Small Ruminant Research*. – 2019. – Vol. 176. – P. 70-75. 3. *Oruc, E. The pathologic and bacteriologic comparison of pneumonia in lambs* / E. Oruc // *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*. – 2006. – Vol. 30. – P. 593-599. 4. *Lindström, L. Bronchopneumonia in Swedish lambs: a study of pathological changes and bacteriological agents* / L. Lindström, F.A. Tauni, K. Vargmar // *Acta Vet Scand*. – 2018. – Vol. 60, 54. 5. *Внутренние болезни животных. Выполнение и оформление курсовой работы : методические указания для студентов дневной и заочной формы получения образования по специальности «Ветеринарная медицина»* / С. В. Петровский, В. Н. Иванов, М. В. Богомольцева, В. Н. Васькин ; Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра внутренних незаразных болезней. – Витебск : ВГАВМ, 2024. – 55 с.

УДК 619:616.379-008.64:636.7

ПАНЬ ЧЭНЬ, студент

Научный руководитель – **Гиско В.Н.**, канд. вет. наук, доцент

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИНЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА У СОБАК

Введение. Сахарный диабет у собак – одно из наиболее распространенных эндокринных заболеваний в ветеринарии. Заболевание чаще встречается у собак среднего и старшего возраста. Предрасполагающими факторами считаются ожирение, генетическая предрасположенность и пол [1, 2].

Задача научной работы состояла в экспериментальном обосновании эффективности применения в лечении инсулинозависимого сахарного диабета у собак свинным инсулином средней продолжительности действия Ленте-инсулин, 40 ЕД/мл.

Материалы и методы исследований. Для решения поставленной задачи в условиях клиники Zhi Ai города Вэйхай провинции Шаньдун КНР после постановки диагноза клиническими методами, биохимического исследования крови, общего анализа мочи, экспресс-теста на кетоновые тела в моче, собаке породы такса был поставлен диагноз «сахарный диабет». Задача опыта состояла в отработке оптимальной дозы препарата Ленте-инсулин для лечения инсулинозависимого сахарного диабета. Инсулин будет вводиться подкожно, режим дозирования будет корректироваться по результатам мониторинга глюкозы.

Результаты исследований. На первом этапе исследований провели клиническое