

for the control of Trichinella in domestic and wild animals intended for human consumption // Veterinary Parasitology. – 2000. – Vol. 9. – P. 393–408. DOI: 10.1016/S0304-4017(00)00354-X 4. Odoevskaya I. M., Spiridonov S. E. *Trichinella nativa* haplotypes in Russia show diversity in cytochrome oxidase MTDNA gene // Veterinary Parasitology. – 2016. – Vol. 231. – P. 39–42. DOI:10.1016/j.vetpar.2016.08.012 5. Romashov B.V., Odoevskaya I.M., Romashova N. B., Golubova N. A. *Ecology of trichinellosis transmission in the Voronezh State Nature Reserve and adjacent areas, Russia // Nature Conservation Research. 2021. – Vol. 6(2). – P. 1–15. <https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2021.023>.*

УДК 619:616.99:636.6

АССОЦИАТИВНЫЕ ПАРАЗИТОЗЫ ПЕРЕПЕЛОВ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Хазиева А.И., Бозова Г.Б.

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», г. Казань, Российская Федерация

*Изучены ассоциативные паразитозы желудочно-кишечного тракта у перепелов в КФХ «Перепелка» г. Казани. Кoprooвoскопией обследовано 60 голов техасского белого перепела 30-60-суточного возраста. Экстенсивность инвазии – 78,3%. Моноинвазии отмечены у 31,9% зараженных, микстинвазии (2-4 вида) – у 68,1%. Преобладали ассоциации «эймерии + аскаридии», к которым часто присоединялись гетеракисы и капиллярии. Микстинвазии вызывали более тяжелые клинические и гематологические сдвиги. Сделан вывод о необходимости комплексной диагностики и комбинированной терапии. **Ключевые слова:** ассоциативные болезни, микстинвазии, перепела, эймерии, аскаридии, гетеракисы, КФХ «Перепелка».*

ASSOCIATIVE PARASITOSEs OF QUAILS IN FARM CONDITIONS

Khazieva A.I., Bozova G.B.

Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman,
Kazan, Russian Federation

*Associative parasitoses of the gastrointestinal tract in quails were studied in the peasant farm "Perepelka", Kazan. 60 Texas white quails aged 30-60 days were examined coproovoscopically. Extensivity of invasion was 78.3%. Monoinvasions were found in 31.9% of infected birds, mixed invasions (2-4 species) – in 68.1%. Associations "Eimeria + Ascaridia" predominated, often with Heterakis and Capillaria. Mixed invasions caused more severe clinical and hematological changes. Comprehensive diagnosis and combined therapy are necessary. **Keywords:** associative diseases, mixed invasions, quails, Eimeria, Ascaridia, Heterakis, peasant farm "Perepelka".*

Введение. Перепеловодство в Татарстане активно развивается, в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах. В КФХ «Перепелка» г. Казани применяют интенсивные технологии, способствующие накоплению возбудителей инвазий. Наибольшую проблему представляют ассоциативные (микст-) инвазии, при которых несколько видов паразитов одновременно поражают организм, вызывая синергический патогенный эффект, иммунную депрессию и снижение продуктивности [1, 2]. У перепелов часто регистрируют микстинвазии эймерий, аскаридий и гетеракисов [3]. Гематологические показатели служат важным критерием тяжести процесса [4, 5]. Цель – изучить структуру ассоциативных паразитозов у перепелов в КФХ «Перепелка».

Материалы и методы исследований. Весной в КФХ «Перепелка» (г. Казань) от 60 перепелов техасской белой породы 30-60-суточного возраста собраны пробы помета. Копроовоскопию выполняли методами Фюллеборна и Дарлинга, ооцисты эймерий выявляли с сульфатом цинка. Видовую идентификацию проводили стандартно [6]. У 15 особей с разным типом инвазии оценивали гематологические показатели (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, лейкоформула). Рассчитывали экстенсивность инвазии (ЭИ).

Результаты исследований. Зараженность паразитами ЖКТ составила 78,3% (47/60). Моноинвазии были у 15 птиц (31,9%), микстинвазии – у 32 (68,1%). В моноинвазиях доминировали эймерии (ЭИ=17,0%) и аскаридии (8,5%). Среди микстинвазий ведущей была двухкомпонентная ассоциация «эймерии + аскаридии» (31,9%), трехкомпонентные «эймерии + аскаридии + гетеракисы» (14,9%) и «эймерии + аскаридии + капиллярии» (10,6%), четырехкомпонентная – 8,5% (таблица 1).

Клинически при микстинвазиях (трех- и четырехкомпонентных) наблюдали выраженное угнетение, взъерошенность оперения, диарею со слизью, анемию слизистых; средняя живая масса была в 1,3-1,5 раза ниже, чем у здоровых. В крови отмечено снижение эритроцитов на 18-26%, гемоглобина на 15-22%, лейкоцитоз с эозинофилией до 12-15%, что согласуется с данными о гематологических сдвигах при инвазиях [4, 5].

Таблица 1 – Структура ассоциаций паразитов у перепелов.

Тип инвазии	Компоненты ассоциации	Число случаев (n=32)	Доля, %
Двухкомпонентная	Эймерии + Аскаридии	15	31,9
Трехкомпонентная	Эймерии + Аскаридии + Гетеракисы	7	14,9
Трехкомпонентная	Эймерии + Аскаридии + Капиллярии	5	10,6
Четырехкомпонентная	Эймерии + Аскаридии + Гетеракисы + Капиллярии	4	8,5
Прочие комбинации	–	1	2,1

Заключение. 1. В КФХ «Перепелка» экстенсивность инвазии перепелов достигает 78,3%, микстинвазии составляют 68,1%, что указывает на доминирование ассоциативных форм.

2. Основу паразитоценоза образуют эймерии и аскаридии, к которым присоединяются гетеракисы и капиллярии.

3. Тяжесть клиники и гематологических сдвигов возрастает с числом сочленов ассоциации.

4. Необходим комплексный лабораторный мониторинг и комбинированная терапия.

Литература. 1. Ятусевич, А. И. *Хозяйственные и биологические особенности перепелов и их восприимчивость к болезням* / А. И. Ятусевич, А. М. Сарока, М. С. Орда // *Паразитарные системы и паразитоценозы животных : материалы V науч.-практ. конф. Междунар. ассоциации паразитоценологов, г. Витебск, 24–27 мая 2016 г.* – Витебск : ВГАВМ, 2016. – С. 215–217. 2. Довгий, Ю. Ю. *Распространение и гематологические показатели у перепелов при эймериозной инвазии* / Ю. Ю. Довгий, А. В. Рудик // *Сельское хозяйство – проблемы и перспективы : сб. науч. тр.* – Гродно : ГГАУ, 2020. – Т. 48 : *Ветеринария.* – С. 89–95. 3. Зеленская, С. А. *Фармако-токсикологическая оценка соединения «С-16» и его эффективность при микстинвазии у перепелов : дис. ... канд. ветеринар. наук : 06.02.03* / С. А. Зеленская. – Казань, 2018. – 182 с. 4. Гирфанов, А. И. *Морфофизиологические изменения эритроцитов у крыс при применении комплексного препарата* / А. И. Гирфанов, А. М. Ежкова, Г. Б. Бозова, О. Д. Бозюкова // *Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.* – 2022. – Т. 251, № 3. – С. 94–97. 5. Бозова, Г. Б. *Интенсивность роста и развития перепелов при использовании наноструктурного препарата* / Г. Б. Бозова, А. И. Гирфанов, О. И. Наумова, А. С. Истомина // *Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.* – 2021. – Т. 246, № 2. – С. 31–34. 6. Бозова, Г. Б. *Органолептические показатели мяса перепелов* / Г. Б. Бозова // *Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.* – 2022. – Т. 250. – С. 23–26.