

УДК 619:615.322:616.5-002.9

КУРАЕВ О.Б., студент (Туркменистан); **ИВАСЮК В.В.**, студент (Республика Беларусь)

Научный руководитель **Николаенко И.Н.**, канд. вет. наук, доцент УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

О ПРИМЕНЕНИИ ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ

Душица обыкновенная (*Origanum vulgare L.*) – многолетнее травянистое растение высотой 30–80 см с ползучим корневищем и прямым стеблем, от основания ветвистым. Листья супротивные, продолговатояйцевидные, на черешках. Цветки мелкие, бледно-пурпуровые, двугубые, собраны в щитковидную метелку на концах ветвей и стеблей. Цветет в июне–августе. Встречается во всех областях. Растет на суходольных лугах, опушках лесов, в зарослях кустарников, по долинам рек. Как лекарственное средство используют надземную часть растения. Заготовка сырья осуществляется в период цветения душицы.

Главные лечебные свойства душицы определяются содержанием в листьях тимола и карвакрола, которые составляют в среднем 70% эфирного масла. Сильные антигельминтные свойства тимола определяют применение настоев душицы (1:10) при аскариозах животных в дозе 2–3 мл на 1 кг живой массы 2 раза в день три дня подряд.

Трава душицы обыкновенной оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, усиливает секрецию пищеварительных, бронхиальных и потовых желез, улучшает аппетит. Усиливает перистальтику и тонус кишечника, тонизирующе действует на сокращение гладкой мускулатуры матки, повышает лактацию, стимулирует секрецию желчи, повышает диурез, а также оказывает противовоспалительное, антимикробное, обезболивающее, дезодорирующее и инсектицидное действия. В настоях душица применяется как отхаркивающее, потогонное средство при бронхитах, пониженной кислотности, также как желчегонное – при атонии кишечника. Применяется повышенной половой возбудимости.

Противопоказано применение душицы беременным самкам и в период лактации.

Рекомендуем для лечения телят, больных абомазоэнтеритом, применять настой душицы обыкновенной в дозе 50 мл перорально 2 раза в сутки в течение 5-7 дней, в комплексном лечении с препаратом «Триметоприм».