

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  
ветеринарной медицины»

**Кафедра зоологии**

**БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
ЭНДОПАРАЗИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ**

Учебно-методическое пособие для студентов  
факультета ветеринарной медицины и биотехнологического факультета  
очной и заочной форм обучения

Витебск  
ВГАВМ  
2016

УДК 619:576.89

ББК 48.46

Б63

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом  
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная  
академия ветеринарной медицины»  
от 13.01.2016 г. (протокол № 1)

Авторы:

доктор ветеринарных наук, профессор *A. И. Ятусевич*, кандидат ветеринарных наук, доцент *H. И. Олехнович*, кандидат ветеринарных наук, доцент *T. В. Медведская*, старший преподаватель *L. И. Рубина*, доктор биологических наук, профессор *A. M. Субботин*, старший преподаватель *E. В. Миклашевская*, ассистент *M. C. Мацинович*

Рецензенты:

кандидат ветеринарных наук, доцент *C. И. Стасюкевич*; кандидат ветеринарных наук, доцент *B. Н. Гиско*

**Биология развития эндопаразитических организмов**: учеб. - метод.

Б63 пособие для студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологического факультета очной и заочной форм обучения / А. И. Ятусевич [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2016. - 44 с.

ISBN 978-985-512-919-7.

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки студентов 1-го курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологического факультета очной и заочной форм обучения к контрольным работам, коллоквиумам и к экзамену по зоологии.

**УДК 619:576.89**

**ББК 48.46**

**ISBN 978-985-512-919-7**

© УО «Витебская ордена «Знак Почета»  
государственная академия ветеринарной  
медицины», 2016

## **ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ**

Д.Х. –	дефинитивный хозяин
Доп. Х. –	дополнительный хозяин
П.Х. –	промежуточный хозяин

РЕПОЗИТОРИЙ УО ВГАУМ

## ВВЕДЕНИЕ

Зоология является общепрофессиональной дисциплиной и служит биологическим введением и фундаментом для изучения многих дисциплин биологического, клинического и зоотехнического циклов (паразитология, анатомия, гистология, физиология сельскохозяйственных животных, животноводство, звероводство, пчеловодство, рыбоводство, племенное дело, зоогигиена, охрана природы и др.).

Изучение зоологии имеет большое значение для подготовки высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства. Познание животного мира важно для общебиологического образования ветеринарного врача и зоотехнера, формирования его мировоззрения.

**Целевое назначение дисциплины:** дать основы знаний о строении и биологии животных организмов, их многообразии и происхождении на основе эволюционного учения. В результате обучения дисциплине студенты всесторонне узнают животный мир, умеют оценить его современное состояние, биогенетическое и хозяйственное значение.

При изучении курса зоологии студенты первого курса встречаются с неизвестной ранее терминологией, применяемой в ветеринарной практике. Особенные трудности возникают при рассмотрении жизненных циклов паразитических организмов. В имеющихся учебниках и учебных пособиях по зоологии эти циклы приводятся очень кратко, поэтому усвоение некоторых тем по зоологии является затруднительным.

Авторами в доступной форме, с приведением схем и таблиц, представлен материал по циклам развития эймерий, малярийного плазмодия, фасциолы, ланцетовидного сосальщика, кошачьего сосальщика, полистомы, бычьего цепня, свиного цепня, эхинококка, огуречного цепня, мониезии, овечьего мозговика, лентеца широкого, аскариса свиного, остицы детской, остицы лошадиной, власоглава, трихинеллы, ришты мединской, скребня-великаны.

Пособие предназначено для подготовки студентов 1-го курса факультетов ветеринарной медицины и биотехнологического факультета очной и заочной формы обучения к контрольным работам, коллоквиумам и к экзамену по зоологии.

## ПРИМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Животные повсюду контактируют с различными паразитическими организмами (гельминтами, простейшими, паукообразными и насекомыми), но заражение наступает не всегда. Многие паразиты обладают инвазирующими способностями только в определенной стадии своего жизненного цикла, другие же могут заражать хозяина в течение всей своей жизни. **Инвазией** называется заражение организма какими-либо паразитами животной природы. **Паразиты** – это животные, живущие и питающиеся за счет других видов животных (хозяев) и причиняющие им при этом вред. Паразиты, в отличие от вирусов и микроорганизмов, могут пользоваться заражаемым ими животным для повторного, многократного кормления, причем не убивают или сразу не убивают своего хозяина, хотя последний может погибнуть через более или менее длительный срок

вследствие заболевания, вызванного паразитом.

По локализации в организме хозяина различают следующие виды паразитов:

**Наружные паразиты**, или **эктопаразиты**, лишь временно садятся на поверхность тела (покровы) хозяина для принятия пищи, – например, комары, слепни, пиявки; другие эктопаразиты не только питаются, но и вообще живут на коже хозяина – пухоеды, вши.

**Внутрикожные паразиты**, живущие в самой толще кожных покровов; в роговом слое эпидермиса млекопитающих буравит ходы и живет чесоточный зудень (*Sarcoptes scabiei*); в мальпигиевом слое кожи человека и свиньи может жить личинка первой фазы развития желудочного овода (*Gastrophilus*).

**Полостные паразиты** обитают в полостях тела, имеющих широкую связь с внешней средой; таковы полость конъюнктивы глаза, полости носа, уха и рта. В полости носа часть личиночного периода проводят личинки оводов *Oestrus* и *Rhinoestrus*.

**Внутренние паразиты**, или **эндопаразиты**, могут обитать в любом органе хозяина: а) эндопаразитов органов, сообщающихся с внешней средой (легкие, кишечник, мочеполовые органы) – различные жгутиковые, саркодовые гельминты и др.; б) паразитов крови – плазмы и форменных элементов (личинки филярий, гемоспоридии, жгутиковые), в) эндопаразитов прочих тканей (личинки трихинеллы в мышцах, ценур в мозгу и др.) и г) эндопаразитов целомических полостей (гельминты).

Для описания биологии паразитических организмов используется общепринятая в паразитологии и зоологии терминология:

- **Марита** – половозрелая особь;
- **Дефинитивный, или окончательный хозяин** — организм, в теле которого паразит становится половозрелым и способен вызвать заболевание;
- **Промежуточный хозяин** — организм, в теле которого паразит проходит одну или несколько личиночных стадий развития;
- **Дополнительный хозяин** — второй промежуточный хозяин;
- **Облигатный, или обязательный хозяин** — организм, в котором паразит находит наилучшие условия для своего развития;
- **Факультативный хозяин** — организм, в котором паразит может обитать, но к которому он не приспособлен;
- **Резервуарный хозяин** — организм, в теле которого паразит не получает дальнейшего развития, а лишь накапливается на инвазионной стадии.

## **Примерный план ответа жизненных циклов паразитов на примере эймерии кроличьей**

1. Латинское название паразита (кроме специальности «зоотехния») *Eimeria magna*.
2. Название заболевания. **Эймериоз.**
3. Кто является хозяевами в данном цикле развития (дефинитивный, промежуточный, дополнительный)?  
**Дефинитивный хозяин - кролик.**
4. Где паразитирует?  
**Паразитирует в эпителиальных клетках кишечника кролика.**
5. Что (кто) является инвазионной стадией?  
**Инвазионная стадия – спорулированная (инвазионная) ооциста.**
6. Описание самого цикла развития:

Цикл развития проходит в три стадии: а) мерогония – увеличение количества особей; б) гаметогония – половой процесс, стадия паразита способная к расселению; в) спорогония - образование спор во внешней среде и т.д.

### **Подцарство ПРОСТЕЙШИЕ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ЭЙМЕРИИ КРОЛИЧЬЕЙ**

**Тип Апикомплекса (Apicomplexa)**

**Класс Споровики (Sporozoa)**

Отряд Кокцидии (Coccidiida)

Вид: эймерия кроличья (*Eimeria magna*)

Эймерии – внутриклеточные паразиты, обитающие в тканях и органах (кишечник, печень, почки и др.) позвоночных и беспозвоночных животных, вызывающие тяжелое заболевание – эймериоз.

Биология развития эймерии характеризуется тремя стадиями развития: мерогонией, гаметогонией, спорогонией.

1. Мерогония - бесполое размножение приводит к увеличению числа паразита в теле хозяина.

2. Гаметогония – образование половых клеток с их последующей копуляцией.

3. Спорогония – проходит во внешней среде при определенной температуре (+18-+25°C), влажности и доступе кислорода. В ооцисте формируются 4 спороцисты и в каждой из них по 2 спорозоита. Такие ооцисты называются спорулированными или инвазионными, которые способны заражать восприимчивое животное.

Рассмотрим цикл развития эймерий на примере паразита кроликов *Eimeria magna* (рисунок 1).

Кролики заражаются эймериями алиментарно, проглатывая вместе с кором инвазионные ооцисты. В кишечнике кролика оболочки ооцисты и споро-

цист растворяются и спорозоиты внедряются в эпителиальные клетки кишечника. Проникнув в них, спорозоит округляется, значительно увеличивается в размерах, превращаясь в *меронта*. Ядро меронта начинает делиться, и он становится многоядерным. Затем возле каждого ядра обособляется цитоплазма и весь меронт распадается на одноядерные удлиненные тельца – *мерозоиты*. Эпителиальная клетка хозяина при этом погибает. Таким образом, процесс бесполого размножения происходит путем множественного деления, или *мерогонии*. Мерозоиты внешне очень похожи на спорозоитов. Они внедряются в здоровые эпителиальные клетки кишечника и процесс мерогонии повторяется (3-4 раза). Все мерозоиты третьего поколения и часть мерозоитов второго поколения дают начало *макро- и микрогаметоцитам*, за счет которых происходит формирование половых клеток, или гамет. Каждый микрогаметоцит растет, накапливает запасные питательные вещества и превращается в большую овальную *макрогамету* с пузыревидным ядром. Микрогаметоцит в начальном периоде развития многократно митотически делится, в результате чего образуется несколько сотен очень мелких ядер. Ядра вытягиваются, окружаются слоем цитоплазмы и превращаются во множество веретеновидных *микрогамет* с двумя жгутиками на переднем конце тела.

Микрогаметы выходят из клетки хозяина и сливаются с макрогаметами, в результате чего образуется *зигота*, выделяющая вокруг себя оболочку и называемая *ооцистой*. Ооциста попадает в просвет кишечника, но дальнейшее ее развитие у кокцидий из рода *Eimeria* происходит только во внешней среде при достаточном доступе кислорода. При этом ядро ооцисты два раза делится, цитоплазма ооцисты окружает каждое ядро и в ооцисте образуется 4 споробласта. Споробласт покрывается оболочкой, и его ядро делится пополам. Вокруг каждого ядра в свою очередь обособляется цитоплазма и образуются спорозоиты. Таким образом споробласт превращается в *спороцисту* с двумя спорозоитами внутри. У эймерий каждая ооциста содержит 4 спороцисты. На этом заканчивается процесс *спорогонии*.


Первые две стадии жизненного цикла проходят в организме хозяина и называются *эндогенными*, третья (развитие ооцист) – проходит во внешней среде и называется *экзогенной*. Ооцисты со спороцистами сохраняют жизнеспособность во внешней среде более года.

### **Краткая схема развития:**

1. *Eimeria magna*.
2. Эймериоз.
3. Дефинитивный хозяин – кролик.
4. Паразитирует в эпителиальных клетках кишечника кролика.
5. Инвазионная стадия – спорулированная ооциста (инвазионная ооциста).

В кишечник кролика из внешней среды алиментарным путем (т.е. с кормом) попадают **зрелые ооцисты**, каждая из которых содержит 4 споры с 2 спорозоитами. Оболочки ооцист и спор под действием ферментов разрушаются, и спорозоиты внедряются в эпителиальные клетки кишечника, где они растут и размножаются бесполым путем – мерогонией. Из одного спорозоита образуется

многоядерная клетка – **меронт**, который лопается и из него выходят **мерозоиты**. Одни из мерозоитов повторно внедряются в эпителиальные клетки кишечника и дают начало второму поколению меронтов (5-6 раз), а часть дает начало **гаметам**. Наступает процесс полового развития – гаметогония. Часть мерозоитов не делится, а растет, обогащаясь питательными веществами, образуя **макро- и микрогаметоциты** → **макро- и микро гаметы**, сливаясь, образуют зиготу (**незрелая ооциста**) → выходит с фекальными массами во внешнюю среду → стадия спорогонии → образование **инвазионной ооцисты**.



- 1- спорозоиты; 2- молодой меронт; 3 – растущий меронт;
- 4- меронт, распавшийся на мерозоиты; 5- мерозоиты; 6- развитие макрогаметы;
- 6 а- развитие микрогамет; 7- микрогамета; 8 - ооциста;
- 9- ооциста, приступающая к спорогонии после выхода во внешнюю среду;
- 10- ооциста с четырьмя споробластами и остаточным телом; 11- развитие спороцист;
- 12- ооциста с четырьмя зрелыми спороцистами (в каждой спороцисте по два спорозоита).

**Рисунок 1 - Цикл развития эймерии**

## ЦИКЛ РАЗВИТИЯ МАЛЯРИЙНОГО ПЛАЗМОДИЯ

**Тип Апикомплекса (Apicomplexa)**

**Класс Споровики (Sporozoea)**

Подотряд Гемоспоридии (Haemosporina)

Вид: плазмодиум малярийный (Plasmodium malariae).

Жизненный цикл кровяных споровиков, как и эймерий, складывается из последовательной смены ряда бесполых размножений путем меропонии, гаме-

тогонии – формирования гаметоцитов, затем гамет с последующим процессом оплодотворения и спорогонии – формирования спорозоитов.

Существенным отличием размножения кровяных споровиков от большинства кокцидий является развитие их в двух хозяевах (позвоночном животном и кровососущем насекомом), без пребывания каких-либо стадий развития паразита во внешней среде. Это привело к исчезновению у них защитной стадии спороцисты.

У малярийных плазмодиев бесполое размножение и образование гаметоцитов происходит в крови человека, тогда как образование гамет из гаметоцитов, копуляция гамет и образование спорозоитов происходит в кишечнике малярийного комара. Следовательно, жизненный цикл кровяных споровиков происходит со сменой хозяев.

Для малярийного плазмодия человек – промежуточный хозяин, а комар рода анофлес – дефинитивный хозяин.


Рассмотрим жизненный цикл малярийного плазмодия на примере *Plasmodium malariae* (рисунок 2).

При сосании крови человека малярийным комаром, в кровь человека попадают спорозоиты, находившиеся в слюнных железах комара. Спорозоиты из плазмы крови проникают в клетки, выстилающие кровеносные сосуды печени. Там они превращаются в меронты, которые быстро растут и приступают к множественному делению – мерогонии. Образовавшиеся многочисленные мерозоиты внедряются вновь в клетки кровеносных сосудов печени. После одной или нескольких генераций меронтов в печени, мерозоиты выходят в плазму крови и внедряются в красные кровяные клетки – эритроциты, где превращаются в меронты меньшего размера.

Молодые меронты, находящиеся внутри эритроцита, подвижны. По мере роста меронт занимает все больше места в эритроците, питаясь его плазмой, содержащей гемоглобин. В результате этого в цитоплазме меронта откладывается пигмент меланин. К концу вторых суток меронт распадается на 12-24 мерозоита. При этом эритроцит разрушается, а мерозоиты выходят в плазму крови. Туда же поступает пигмент меланин и другие продукты метаболизма паразита, которые действуют отравляюще на организм человека и вызывают приступ малярии. Вышедшие в плазму крови мерозоиты внедряются в здоровые эритроциты, мерогония начинается снова и длится также 48 часов. Так следует одно бесполое поколение за другим.

Часть мерозоитов, внедрившихся в эритроциты, превращается в макро- и микрогаметоциты. Так начинается гаметогония – процесс образования половых клеток. Макрогаметоциты достигают размера эритроцита или превышают его и богаты пигментом; микрогаметоциты немного меньших размеров. Гаметоциты в крови человека дальше не развиваются. Для дальнейшего развития гаметоциты должны попасть в желудок малярийного комара, что происходит при сосании комаром крови больного малярией. Меронты в кишечнике комара погибают, а гаметоциты остаются. Макрогаметоциты превращаются в макрогаметы, микрогаметоциты образуют несколько подвижных жгутиковидных микрогамет. На этом процесс гаметогонии завершается.

Затем в желудке комара происходит копуляция – слияние макро- и микрогамет. Образуется подвижная зигота удлиненной формы, которую называют *оокинетой*. Оокинета проникает сквозь эпителий желудка комара к базальной перепонке эпителия, покрывается оболочкой и превращается в ооцисту, которая растет, выпячивая мышечную стенку желудка. В ооцисте происходит многократное деление ядра, в результате которого образуется до 10 тысяч ядер. Цитоплазма с ядрами разделяется на отдельные тяжи (споробласти), из которых образуются серповидные *спорозоиты*. Этим заканчивается процесс *спорогонии*. Созревшие ооцисты лопаются, а спорозоиты попадают в гемолимфу комара и проникают в слюнные железы. При укусе комара в кровь человека попадает большое количество спорозоитов.



- 1, 2 - спорозоиты, проникающие в клетки кровеносных сосудов печени человека;  
 3, 4 - мерогония (образование мерозоитов); 5 - проникновение мерозоита в эритроцит;  
 6-9 - рост мерозоита и мерогония; 10 - выход мерозоитов из эритроцита (далее эритроцитарный цикл повторяется); 11,12 - развитие макрогоаметоцита;  
 11 а, 12 б- развитие микрогоаметоцита; 13 - макрогоамета; 14 - микрогоаметоцит;  
 15 - образование микрогоамет; 16 - копуляция гамет; 17 - зигота; 18 - оокинета;  
 19 - проникновение оокинеты через стенку желудка комара;  
 20 - превращение оокинеты в ооцисту; 21-23 - рост ооцисты с образованием спорозоитов;  
 24 - выход спорозоитов из ооцисты в гемолимфу комара;  
 25- спорозоиты, проникшие в слюнные железы комара.

**Рисунок 2 - Цикл развития малярийного плазмодия**

### **Краткая схема развития:**

1. **Plasmodium malariae.**
2. Малярия.
3. Д.Х. – комар р. Анофелес, П.Х. – человек.
4. У комара - кишечник, у человека – печень, плазма крови.
5. При укусе комара в кровь человека попадает большое количество спорозоитов.

**Отличия от цикла развития эймерий:** а) нет стадии развития во внешней среде; б) мерогония происходит в теле человека, гаметогония и спорогония – в теле комара; в) у малярийного плазмодия отсутствуют защитные оболочки ооцист и спор; г) цикл развития у малярийного плазмодия проходит с участием двух хозяев; д) зигота называется оокинетой и она подвижна.

Зараженный комар кусает человека → спорозоиты в кровь → печень человека → внедряются в ее клетки (стадия мерогонии) и превращаются в меронты → мерозоиты → новые клетки печени (5-6 раз) → эритроциты, пройдя несколько циклов мерогонии, мерозоиты в эритроцитах превращаются в макро- и микрограметоциты → в этот момент комар должен укусить зараженного человека → кишечник комара, желудок (стадия гаметогонии) → макро- и микрограметы → зигота (оокинета) → прободает стенку желудка → превращается в ооцисту (стадия спорогонии), созревает, лопается, спорозоиты попадают в полость тела комара и самостоятельно передвигаются в слюнные железы комара.

## **Подцарство МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ**

### **Класс ТРЕМАТОДЫ**

Жизненный цикл сосальщиков сложен, так как связан со сменой хозяев и чередованием личиночных стадий развития самих паразитов. Все заболевания, вызываемые дигенетическими сосальщиками, называют *трематодозами*. Они являются предметом изучения ветеринарной и медицинской гельминтологии.

#### **ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНОГО СОСАЛЬЩИКА**

**Тип Плоские черви (Plathelminthes)**

**Класс Дигенетические сосальщики (Trematoda)**

Отряд Фасциолиды (Fasciolida)

Вид: печёночный сосальщик (*Fasciola hepatica*)

Печеночный сосальщик (*Fasciola hepatica*) паразитирует в желчных протоках печени мелкого и крупного рогатого скота, реже в печени других животных или человека, вызывая заболевание фасциолёз, и выделяет огромное количество яиц. Из печени яйца через желчный проток попадают в кишечник, а оттуда вместе с фекалиями выбрасываются наружу. Дальнейшее развитие получают те яйца, которые попадают в воду. В воде, при благоприятных условиях, в

яйце формируется личинка *мирацидий*, который покидает яйцо и свободно плавает при помощи ресничек, расположенных по всему телу. Находит промежуточного хозяина – малого прудовика (*Lymnaea truncatula*) – и нападает на него. Промежуточными хозяевами фасциол могут быть, кроме малого прудовика, другие виды моллюсков (рисунок 3).

Попав в печень прудовика, мирицидий сбрасывает свой ресничный покров и превращается в *спороцисту* мешковидной формы. По прошествии 15–30 дней внутри спороцисты путем партеногенеза формируются *редии* — продолговатые образования, снабженные ртом, глоткой и слепо заканчивающимся кишечником. Редии прорывают оболочку спороцисты и выходят из нее, оставаясь в органах моллюска.

Из одной спороцисты путем бесполого деления (партеногенеза) образуется 5—15 редий, каждая из которых может дать новое поколение личинок (до-черных редий). Редии продолжают свой рост и через 35—40 дней формируют до 15—20 *церкариев*, снабженных двумя присосками, длинным хвостом и разветвленным кишечником (по форме они похожи на головастиков). Срок развития от мирицидия до церкария в теле моллюска исчисляется 50—80 днями.

Достигнув определенного возраста, церкарии выходят из организма моллюска через его ротовое отверстие и начинают плавать в воде, используя для этого свой хвост. Число церкариев у одного зараженного моллюска может достигать 600—800. Из моллюска они обычно выходят в течение нескольких недель.

На цикл развития от яйца до церкария во временных, хорошо прогреваемых водоемах (лужи, небольшие болотца, выемки от копыт скота) в теплый период года требуется 70—140 дней.

Через несколько часов после выхода из моллюска, церкарии отбрасывают хвостик, выделяют клейкий, застывающий секрет и покрываются твердой коричневатой капсулой (инцистируются). Часть церкариев прикрепляются к листьям и стеблям растений, а остальные свободно плавают на поверхности воды. В этой стадии развития паразиты называются *адолескариями*.

Цистаadolескария толстая и состоит из двух оболочек. В ней содержится подвижный зародыш фасциолы с хорошо выраженным ротовой и брюшной присосками, разветвленным кишечником.

На зараженных пастбищах животные проглатываютadolескариев, когда пьют воду из луж и канав или поедают траву. В кишечнике животного оболочкаadolескариев растворяется и зародыши попадают в печень и там развиваются в половозрелые формы фасциол.

Фасциолы проникают в желчные ходы двумя путями. Часть личинок внедряется в слизистую оболочку кишечника, в кишечные вены и через воротную вену продвигается в печень. Оказавшись в сосудах с малым диаметром, молодые фасциолы не могут двигаться дальше; они пробуравливают сосудистую стенку, затем печеночную ткань и спустя несколько недель проникают в желчные ходы. Другая часть личинок проходит через стенку кишечника в брюшную полость, а затем через капсулу печени в желчные ходы.

Для полного развития фасциолы в печени крупного рогатого скота требу-

ется 3- 4 месяца, после чего паразит превращается в половозрелую форму, начинает продуцировать яйца и может сохраняться в организме животного 5 лет и более.

### **Краткая схема развития:**

1. *Fasciola hepatica*.

2. Фасциолёз.

3. Д.Х.- крупный рогатый скот, овцы и другие травоядные; П.Х. – моллюск малый прудовик.

4. Паразитирует в желчных протоках печени коровы.

5. Инвазионная стадия –adolескарий.

Крупный рогатый скот с фекальными массами во внешнюю среду → яйца (обязательно вода) → в яйце в воде формируется личинка **мирацидий** → плавает и нападает на малого прудовика → печень моллюска → **спороциста** → **редия** → **церкарий** → покидает моллюска и свободно плавает в воде, прикрепляется к травинке, отбрасывает хвостик → **adolескарий**.

Дефинитивный хозяин заразится фасциолёзом, если съест траву (любой корм) сadolескарием.



А - дефинитивный хозяин; Б –промежуточный хозяин (малый прудовик); 1- марита; 2- яйцо; 3- мирадиций; 4- спороциста; 5- редия; 6- церкарий; 7- адолоскарий.

**Рисунок 3 – Цикл развития печеночного сосальщика**

## **ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ЛАНЦЕТОВИДНОГО СОСАЛЬЩИКА**

**Тип Плоские черви (*Plathelminthes*)**

**Класс Дигенетические сосальщики (*Trematoda*)**

**Отряд Фасциолиды (*Fasciolida*)**

**Вид: ланцетовидный сосальщик (*Dicrocoelium lanceatum*)**

Ланцетовидный сосальщик (*Dicrocoelium lanceatum*) – паразит печени крупного рогатого скота, овец, коз и других животных, иногда встречается и у человека, вызывая заболевание дикроцелиоз. Он значительно меньше печеночного сосальщика. Дикроцелии развиваются с помощью промежуточных хозяев — сухопутных моллюсков более 40 видов различных родов: *Helicella crenimargo* и др., слизней и муравьев (более 20 видов из рода *Formica*) (рисунок 4).

Половозрелые трематоды откладывают в желчных протоках печени и желчном пузыре яйца, которые вместе с желчью попадают в кишечник, а затем с калом выбрасываются наружу. Эти яйца заключают сформированный *мирацидий*, который в отличие от мирадиев фасциол не выходит во внешнюю среду, а вместе с яйцом проглатывается моллюсками. В кишечнике последнего мирадией покидает яйцо и мигрирует в печень, где он теряет ресничный покров и превращается в *материнскую спороцисту*, внутри которой партеногенетически развиваются *дочерние спороцисты*.

После появления дочерних спороцист редуцируются материнские спороцисты, а в дочерних формируются *церкарии*. После созревания они покидают спороцисту и мигрируют в легкие моллюска, а оттуда — в его дыхательную полость. Здесь каждый церкарий инфицируется, а затем все они концентрируются в группы по 100—300 экземпляров, именуемые слизистыми комочками, выбрасываются через дыхательное отверстие наружу, попадают на растения или другие предметы и приклеиваются к ним. Срок развития в моллюсках продолжается от 82 дней до 5 месяцев. Слизистые комочки с церкариями уносятся муравьями и поедаются в муравейниках.

В теле муравьев через 26—62 дня церкарии превращаются в *метацеркариев*, некоторые из них могут внедряться в подглоточный ганглий, иннервирующий челюстной аппарат насекомого. У муравья нарушается функция нервной системы и, следовательно, нормальная работа челюстей. При понижении температуры окружающей среды, муравьи, захватывая листочки, не могут разжать челюсти — наступает состояние оцепенения. Это происходит утром, вечером и в пасмурную погоду в течение дня.

Животные заражаются дикроцелиозом, проглатывая вместе с травой муравьев, содержащих инфицированных метацеркариев.

Метацеркарии из кишечника через дивертикул желчного протока в две-надцатиперстной кишке мигрируют сначала в главный желчный проток, а затем в мелкие. По мере роста они вновь спускаются в крупные желчные протоки, в которых достигают половой зрелости и начинают выделять яйца. Срок развития дикроцелий в организме овец при экспериментальном заражении равен 72—85 дням.

### Краткая схема развития:

1. *Dicrocoelium lanceatum*.

2. Дикроцелиоз.

3. Д.Х. – крупный и мелкий рогатый скот и другие травоядные; П.Х. – слизни, сухопутные моллюски; Доп.Х. – муравей.

4. Паразитирует в печени коровы, овцы.

5. Инвазионная стадия – метацеркарий.

Мелкий рогатый скот с фекальными массами во внешнюю среду → яйца с уже развивающимся миракидием → сухопутный моллюск → спороциста → **до-  
черние спороцисты → церкарии** → из дыхательных путей моллюска в слад-  
ком комочке слизи → муравей → **метацеркарий**.

Дефинитивный хозяин заразится дикроцелиозом, если съест траву с му-  
равьем, в котором находятся метацеркарии.



А - дефинитивный хозяин; Б - 1-й промежуточный хозяин; В – 2-ой промежуточный хозяин; 1 - яйцо с миракидием; 2 – миракидий; 3 – спороциста; 4 - дочерняя спороциста; 5 – церкарий; 6 - метацеркарий.

**Рисунок 4 – Цикл развития ланцетовидного сосальщика**

## ЦИКЛ РАЗВИТИЯ КОШАЧЬЕГО СОСАЛЬЩИКА

Тип Плоские черви (*Plathelminthes*)

Класс Дигенетические сосальщики (*Trematoda*)


Отряд Фасциолиды (*Fasciolida*)

Вид: кошачий сосальщик (*Opisthorchis felineus*)

Кошачий сосальщик (*Opisthorchis felineus*) паразитирует в печени кошек, собак, вызывая заболевание описторхоз. Имеет двух промежуточных хозяев.

Яйца *Opisthorchis felineus* попадают в воду, имеют сформировавшегося *мирацидия*, который не вылупляется из яйцевых оболочек. Выход мириацидия из яйца происходит лишь в кишечнике промежуточного хозяина — пресноводного моллюска *Bythynia leachi*. Мириацидий проникает через кишечную стенку в полость тела моллюска, где превращается в *спороцисту*. Примерно через месяц из спороцист претеногенетически образуются *редии*, в которых начинают развиваться *церкарии*. Затем, примерно через 2 месяца, церкарии покидают организм моллюска и плавают близ дна водоема. Такие церкарии нападают на дополнительных хозяев — пресноводных рыб (различные виды сем. карповые), проникают через их кожные покровы в мышечную и соединительную ткани, где инфицируются и превращаются в *метацеркариев*, достигающих инвазионной стадии лишь через 6 недель (рисунок 5).

Заражение дефинитивных хозяев описторхозом происходит при поедании сырой, слабомороженой или вяленой рыбы, инвазированной метацеркариями этого паразита. Проглоченные вместе с рыбой метацеркарии освобождаются из цист и проникают в желчные ходы печени не гематогенным путем, а через желчный проток. Уже через 5 часов после заражения можно обнаружить метацеркариев в желчных ходах печени дефинитивных хозяев. Здесь паразиты останавливаются, растут и через 3—4 недели достигают половой зрелости. Таким образом, весь цикл развития от яйца до половозрелой стадии длится 4—4,5 месяца.



А - дефинитивный хозяин; Б - 1-й промежуточный хозяин; В - 2-й промежуточный хозяин; 1 - яйцо с мириацидием; 2 – мириацидий; 3 – спороциста; 4 – редия; 5 – церкарий; 6 - метацеркарий.

**Рисунок 5 – Цикл развития кошачьего сосальщика**

### **Краткая схема развития:**

1. ***Opisthorchis felineus.***
2. Описторхоз.
3. Д.Х. – человек, кошки, плотоядные, П.Х. – моллюск битиния личи, Доп.Х. – рыба, семейства карповых.
4. Паразитирует в печени дефинитивного хозяина.
5. Инвазионная стадия – **метацеркарий.**

Кошка с фекальными массами во внешнюю среду (воду) выделяет яйца паразита, с уже сформировавшимся **мироцидием** → заглатывает битиния личи → в теле моллюска мирадиций превращается в **спороцисту** → **редии** → **церкарии** → выходят в воду и нападают на рыб (карповых) → в теле рыбы → **метацеркарии.**

Человек, кошка, собака, пушные звери заражаются описторхозом, если съедают рыбу семейства карповых с метацеркариями.

### **ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПОЛИСТОМЫ**

#### **Тип Плоские черви (*Plathelminthes*)**

#### **Класс Моногенетические сосальщики (*Monogenea*)**

Вид: лягушачий сосальщик (*Polystoma integerrimum*)

Во взрослом состоянии этот паразит (*Polystomum integerrimum*) живет в мочевом пузыре лягушки, удерживаясь там при помощи присосок и крючков. Весной червь высасывается из мочевого пузыря через клоаку лягушки наружу и откладывает яйца в воду. Из яйца выходит личинка, покрытая ресничками, имеющая глазки, а на заднем конце тела — диск с шестнадцатью крючочками. Поплавав некоторое время в воде (не более 48 ч), личинка может прикрепиться к жабрам молодого головастика. При этом она быстро развивается, при благоприятных условиях через 20—25 дней достигает половой зрелости и начинает откладывать яйца. Когда внутренние жабры головастика зарастают, личинки погибают. Если личинка начинает паразитировать на более зрелом головастике, то ее развитие замедляется и половая зрелость не наступает. После зарастания жаберных щелей головастика личинка мигрирует по поверхности тела в клоаку, а оттуда в мочевой пузырь. Это совпадает по времени с превращением головастика в лягушку, а личинка в это время превращается в сосальщика, который растет и достигает половой зрелости лишь на третий год. Таким образом, жизненный цикл полистомы сопряжен с развитием их хозяев — лягушек. Первое поколение полистом развивается в период появления головастиков, а второе поколение — при метаморфозе головастиков в лягушек. Размножение полистом происходит одновременно с хозяином.

### **Класс ЦЕСТОДЫ**

Все цестоды являются биогельминтами, т. е. их развитие происходит с участием одного (цепни) или двух (лентецы) промежуточных хозяев. В организме последних цестоды находятся в виде личинок, имеющих различное

строение. Основными типами личинок ленточных червей (финн) являются: цистицерк, ценур, эхинококк, цистицеркоид и плероцеркоид.

Цистицерк — пузырчатое образование, заполненное прозрачной жидкостью и окруженное соединительнотканной капсулой. Внутри пузыря к его стенке прикреплен один зародышевый сколекс с присосками и крючьями или без них.

Ценур — пузырь аналогичного строения с той разницей, что на его внутренней оболочке располагается не один, а множество сколексов.

Эхинококк — однокамерный пузырь с плотными стенками, состоящими из нескольких оболочек. Внутренняя оболочка продуцирует дочерние пузыри с образующимися в них внучатыми и т. д. Сколексы располагаются как на внутренних стенках пузырей, так и в жидкости, заполняющей финну.

Цистицеркоид — микроскопическая личинка, имеющая расширенную переднюю часть с завернутым внутрь (инвагинированным) сколексом. Задняя часть — церкомер — в виде хвостового придатка несет эмбриональные крючочки.

Процеркоид — личинка лентецов с удлиненным телом, имеющая на переднем конце эмбриональные ботрии, а на заднем — церкомер с крючочками.

Плероцеркоид — личинка лентецов, иногда до 1 м длиной, с ботриями на переднем конце тела.

## ЦИКЛ РАЗВИТИЯ БЫЧЬЕГО ЦЕПНЯ

**Тип Плоские черви (Plathelminthes)**

**Класс Ленточные черви (Cestoda)**


**Отряд Цепни (Cyclophyllidea)**

**Вид: бычий цепень (*Taeniarhynchus saginatus*)**

Бычий цепень *T. saginatus* развивается с участием двух хозяев: промежуточного и дефинитивного. Единственным дефинитивным хозяином бычьего цепня является человек, в тонком кишечнике которого паразит может жить очень долго — до 15 лет и более, вызывая заболевание тениаринхоз. Самопроизвольный выход члеников из ануса пораженного человека наблюдается почти ежедневно. Вышедшие во внешнюю среду с фекалиями членики способны активно передвигаться, рассеивая яйца (рисунок 6).

Крупный рогатый скот (промежуточный хозяин) заглатывает вместе с кормом или водой членики или яйца бычьего цепня. В желудочно-кишечном тракте крупного рогатого скота под влиянием пищеварительных соков оболочки яиц разрушаются, и из них выходят зародыши - онкосфераe, которые при помощи крючьев проникают в слизистую оболочку кишечника, затем в кровеносные сосуды. Током крови они заносятся в поперечно-полосатые мышцы и фиксируются в межфибрillлярной ткани, превращаясь в цистицерков, вызывая у промежуточного хозяина заболевание цистицеркоз. Цистицерки становятся инвазионными через полгода после внедрения онкосферы в мышцы. Человек заражается, поедая сырое или плохо проваренное говяжье мясо, пораженное цистицерками. В тонком кишечнике головка цистицерка выворачивается, при-

крепляется к слизистой оболочки и начинается рост бычьего цепня. Через 2,5 - 3 месяца гельминт достигает половой зрелости и начинает отторгать зрелые членики с яйцами. Зрелые цестоды ежесуточно выделяют в среднем 6-8 члеников. Продолжительность жизни цестоды в кишечнике человека более 10 лет.



А – дефинитивный хозяин; Б – сколекс; В – гермафродитный членик;  
Г – зрелый членик; Д – яйцо; Е – промежуточный хозяин, инвазированный  
цистицерками (крупный рогатый скот).

**Рисунок 6 – Цикл развития бычьего цепня**

#### Краткая схема развития:

1. *Taeniarhynchus saginatus*.
2. У Д.Х. – тениаринхоз, у П.Х. – цистицеркоз.
3. Д.Х. – человек; П.Х. – крупный рогатый скот.
4. У человека – паразитирует в тонком отделе кишечника, у крупного рогатого скота – в поперечно-полосатой мускулатуре, сердце.
5. Инвазионная стадия: для человека – говядина, пораженная цистицерками; для крупного рогатого скота – яйца паразита с личинками – онкосферами.

Из человека с фекальными массами во внешнюю среду выделяются зрелые членики паразита, которые лопаются и рассеивают яйца. П.Х. (корова) съедает траву или другой корм, на котором находятся яйца паразита → кишечник → онкосфера → кровь → поперечно-полосатая мускулатура и превращается в личинку **цистицерк**.

Человек заражается тениаринхозом при употреблении в пищу плохо термически обработанной говядины с цистицерком.

## ЦИКЛ РАЗВИТИЯ СВИНОГО ЦЕПНЯ

**Тип Плоские черви (Plathelminthes)**

**Класс Ленточные черви (Cestoda)**

**Отряд Цепни (Cyclophyllidea)**

**Виды: свиной цепень (Taenia solium)**

Развитие свиного цепня (*Taenia solium*) происходит, как и у бычьего цепня. Из организма человека, который является окончательным хозяином, во внешнюю среду выделяются зрелые членики. Они лопаются и рассеивают яйца во внешней среде. Для дальнейшего развития яйца должны быть проглочены промежуточным хозяином – свиньей. В желудке свиньи из яйца выходит личинка *онкосфера*, которая, пройдя с пищей в кишечник, при помощи крючков внедряется в стенку кишечника и проникает в кровеносные сосуды. С током крови онкосфера разносится по организму и попадают в различные ткани и органы, преимущественно в мускулатуру и соединительную ткань, а также в глаза, мозг, печень, легкие. Здесь онкосфера превращается в личиночную стадию – *цистицерк*, вызывая у промежуточного хозяина заболевание цистицеркоз или финноз. Цистицерк свиного цепня представляет собой пузырек размером с небольшую горошину, в которой головка (сколекс), имеющая четыре присоски, ввернута внутрь. Человек заражается свиным цепнем при питании сырым или мало прожаренным мясом, содержащим цистицерки. Под влиянием желчи головки цистицерка вывертываются наружу и присосками прикрепляются к стенке кишечника, а шейный отдел начинает отделять молодые проглоттиды, вызывая заболевание тениоз (рисунок 7).


Человек для вооруженного цепня является не только окончательным, но и промежуточным хозяином (носителем, как цепня, так и цистицерка). Заражение его цистицеркозом происходит двумя путями: при проглатывании яиц с пищей (с загрязненными овощами и другими продуктами) или при внутреннем (автоинвазировании) заражении, когда членики или яйца из кишечника больного тениозом человека попадают в его же желудок при антипериостальтических движениях (рвоте).

### Краткая схема развития:

1. **Taenia solium**
2. У Д.Х. – тениоз, у П.Х. – цистицеркоз.
3. Д.Х. – человек; П.Х. – свинья.
4. У человека – паразитирует в тонком отделе кишечника, у свиньи – в поперечно-полосатой мускулатуре, сердце.
5. Инвазионная стадия: для человека – свинина, пораженная цистицерками; для свиньи – яйца паразита с личинками – онкосферами.

Из человека с фекальными массами во внешнюю среду выделяются зрелые членики паразита, которые лопаются и рассеивают яйца. П.Х. (свинья) съедает любой корм, на котором находятся яйца паразита → кишечник → онкосфера → кровь → поперечно-полосатая мускулатура и превращается в личинку **цистицерк**.

Человек заражается тениозом при употреблении в пищу плохо термически обработанной свинины с цистицерками.



А - дефинитивный хозяин – человек; Б – сколекс; В- гермафродитный членик; Г- группа зрелых члеников; Д- яйцо; Е - промежуточный хозяин, инвазированный цистицерками; Ж - цистицерк в мясе; З - цистицеркоз мозга при аутоинвазии человека; И - человек в роли факультативного промежуточного хозяина.

**Рисунок 7 – Цикл развития свиного цепня**

### ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ЭХИНОКОККА

**Тип Плоские черви (Plathelminthes)**

**Класс Ленточные черви (Cestoda)**

**Отряд Цепни (Cyclophyllidea)**

**Вид: эхинококк (Echinococcus granulosus)**

Половозрелая форма (*Echinococcus granulosus*) – очень маленький червь (2-6 мм длиной), состоящий из сколекса и трех-четырех проглоттид. Паразитирует в тонком отделе кишечника собак, волков, шакалов (заболевание имагинальный эхинококкоз). Из организма окончательного хозяина во внешнюю среду выделяются зрелые членики, загрязняя почву, траву, корма, водоемы, помещения и другие объекты. В одном зрелом членике содержится до 800 и более яиц. Членики активно двигаются, выходят из фекалий и расползаются на рас-

стояние 5-25 см в различных направлениях. При этом из них выделяются яйца, которые с помощью клейкого вещества прикрепляются к траве и другим субстратам.

Отдельные членики остаются в перианальной области, откуда расползаются по поверхности тела, загрязняя шерсть. У плотоядных появляется зуд, они расчесывают анус о различные предметы, тем самым способствуют рассеиванию яиц (рисунок 8).

Для дальнейшего развития яйца должны попасть к промежуточным хозяевам, к которым относится свыше 60 видов млекопитающих. Промежуточный хозяин (все виды сельскохозяйственных животных и человек) заглатывает яйца или зрелые членики эхинококка с кормом или водой. В пищеварительном тракте промежуточного хозяина оболочка яиц разрушается и освобождаются зародыши (онкосфера). При помощи крючьев они внедряются в стенку кишечника, затем, по кровеносным сосудам, разносятся в разные органы, где оседают и развиваются в пузырчатую стадию - эхинококк. Эхинококк – пузырь, состоящий из кутикулярной и герминативной оболочек. Внутри пузыря образуются вторичные и третичные (дочерние и внучатые) пузыри, которые заполнены жидкостью с выводковыми капсулами. В каждой выводковой капсule содержится до 50 зародышей. Эхинококковые пузыри развиваются в различных органах и тканях многих видов животных, размер их различный – от горошины до 30-35 см в диаметре. Известен случай, когда из организма коровы был извлечен эхинококковый пузырь, вмещавший 54 л жидкости (заболевание у промежуточного хозяина лярвальный эхинококкоз).

Эхинококки чаще локализуются в печени, легких, реже в селезенке, почках и других органах. Дефинитивные хозяева заражаются при поедании пораженных эхинококковыми пузырями органов и тканей животных. В кишечнике дефинитивных хозяев сколексы освобождаются, с помощью вооруженного хоботка и присосок прикрепляются к слизистой тонких кишок, чаще между ворсинками, и начинают расти и формироваться в половозрелых паразитов. Из одного сколекса вырастает одна половозрелая цестода. В дальнейшем в кишечнике собак и других плотоядных эхинококкусы достигают половой зрелости за 68-97 суток. Продолжительность жизни гельминтов от 5 до 7 месяцев.


### **Краткая схема развития:**

1. *Echinococcus granulosus*.
2. Для Д.Х. и П.Х. – эхинококкоз.
3. Д.Х. – представители сем. псовые. П.Х. – кроме псовых все виды сельскохозяйственных животных и человек.
4. У Д.Х. – тонкий отдел кишечника, у П.Х. – паренхиматозные органы, костная ткань.
5. Инвазионная стадия для псовых – паренхиматозные органы любого животного, пораженные эхинококковыми пузырями; для П.Х. – яйца паразита с онкосферами.

Из собаки с фекальными массами во внешнюю среду выделяются зрелые членики паразита, которые лопаются и рассеивают яйца. П.Х. (все виды сель-

сельскохозяйственных животных, человек) съедают любой корм на котором находятся яйца паразита → кишечник → онкосфера → кровь → паренхиматозные органы и превращается в личинку **эхинококк**.

Дефинитивный хозяин заражается эхинококкозом при употреблении в пищу пораженных эхинококковыми пузырями паренхиматозных органов промежуточного хозяина.



А - дефинитивный хозяин – плотоядные животные; Б - зрелый членик; В – яйцо;  
Г- промежуточный хозяин – сельскохозяйственные животные; Д - эхинококковый  
пузырь в печени; Е - факультативный промежуточный хозяин – человек.

**Рисунок 8 – Цикл развития эхинококка**

### **ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ОВЕЧЬЕГО МОЗГОВИКА**

**Тип Плоские черви (Plathelminthes)**

**Класс Ленточные черви (Cestoda)**

**Отряд Цепни (Cyclophyllidea)**

**Вид: овечий мозговик (Multiceps multiceps)**

Паразитирует данная (*Multiceps multiceps*) цестода в тонком кишечнике собак, лисиц, волков и других псовых – заболевание мультицептоз. Во внешнюю среду выделяются зрелые членики, которые лопаются и рассеивают яйца. Промежуточные хозяева (овцы, крупный рогатый скот, яки, верблюды, свиньи и некоторые дикие животные) заражаются алиментарным путем, поедая различный корм, загрязненный яйцами или члениками цестоды на пастбище, вблизи овчарни и т. д. (рисунок 9).

Онкосфера гельминта из кишечника овцы током крови проникают в различные органы, в том числе в головной и спинной мозг, и там за 2,5-3 месяца формируется инвазионная стадия – *ценур*, вызывая заболевание у промежуточного хозяина ценуроз. Ценур представляет собой пузырь, заполненный жидкостью и имеющий на внутренней поверхности оболочки до 200 зародышевых головок. Размеры ценуров иногда достигают величины куриного яйца.


В свою очередь, дефинитивные хозяева заражаются при поедании головного или спинного мозга животных, пораженных ценурами. В кишечнике плотоядных паразиты достигают половой зрелости через 1,5 – 2 месяца.

### **Краткая схема развития:**

1. *Multiceps multiceps*.
2. У Д.Х. – мультицептоз, у П.Х. - ценуроз
3. Д.Х. – собаки, волки; П.Х. – овцы, козы.
4. У Д.Х. – паразитирует в тонком отделе кишечника, у П.Х. – в головном мозге.
5. Инвазионная стадия: для собаки – головной мозг, пораженный ценуром; для овцы – яйца паразита с личинками – онкосферами.

Собака с фекальными массами во внешнюю среду выделяет зрелые членики паразита, которые лопаются и рассеивают яйца. П.Х. (овца) съедает любой корм на котором находятся яйца паразита → кишечник → онкосфера → кровь → головной мозг и превращается в **личинку ценур**.

Дефинитивный хозяин заражается мультицептозом при съедании головного мозга промежуточного хозяина, пораженного ценуром.



А - зрелый членик; Б - дефинитивный хозяин; В – яйцо; Г - промежуточный хозяин;  
Д - ценур в мозгу у овцы.

**Рисунок 9 – Цикл развития овечьего мозговика**

## ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ОГУРЕЧНОГО ЦЕПНЯ

**Тип Плоские черви (Plathelminthes)**

**Класс Ленточные черви (Cestoda)**

**Отряд Цепни (Cyclophyllidea)**

**Вид: огуречный цепень (*Dipylidium caninum*)**

Дефинитивным хозяином этого вида цестоды (*Dipylidium caninum*), паразитирующей в тонком отделе кишечника, служат хищники (собаки, лисы, шакалы, кошки и т.д.), заболевание дипилидиоз. Длина стробилы огуречного цепня колеблется от 20 до 40 см. Формирующиеся яйца располагаются не в общей полости матки, а внутри особых капсул, называемых «яйцевыми коконами», стенки которых развиваются за счет тканей материнского организма. Они не только выводятся во внешнюю среду вместе с фекалиями, но могут активно выползать через анальное отверстие и скапливаться в перианальной области. Содержащиеся в «коконах» яйца в этих случаях становятся легкой добычей власоедов, личинок блох, которые и служат промежуточным хозяином. Из организма окончательного хозяина во внешнюю среду выделяются зрелые членики, содержащие «коконы» с яйцами (рисунок 10).

Они поедаются личинками блох, которые живут в подстилке, мусоре, трещинах пола и питаются органическими субстратами. В полости тела промежуточного хозяина онкосфера превращается в цистицеркоидов. У власоедов этот процесс совершается довольно быстро. У блох же он растягивается на длительный промежуток времени. В личинке блохи онкосфера не претерпевает никаких изменений; у куколки начинается формирование цистицеркоида, и лишь у имаго эта личиночная стадия становится инвазионной. У одной блохи может быть обнаружено до 50 цистицеркоидов.


Животные заражаются при заглатывании блох или власоедов, зараженных цистицеркоидами. Заражение происходит во все сезоны года, чаще в летнее время. Продолжительность жизни взрослого паразита составляет несколько месяцев.

### Краткая схема развития:

1. *Dipylidium caninum*.
2. Для Д.Х. - дипилидиоз.
3. Д.Х. – представители сем. Псовые, П.Х. – блохи, власоеды.
4. У Д.Х. – тонкий отдел кишечника.
5. Инвазионная стадия для собаки – блохи, власоеды с цистицеркоидами.

Из собаки во внешнюю среду выделяются зрелые членики паразита, которые лопаются и рассеивают яйца. П.Х. (блохи, власоеды) съедают яйца паразита → желудок → онкосфера → тело насекомого и превращается в личинку цистицеркоид.

Дефинитивный хозяин заражаются при заглатывании блох или власоедов, зараженных цистицеркоидами.



А - дефинитивный хозяин – собака; Б – сколекс; В - гермафродитный членик;  
Г - зрелый членик; Д - яйцевой кокон с яйцами; Е - промежуточный хозяин – насекомое;  
Ж – цистицеркоид; З - факультативный промежуточный хозяин – человек.

**Рисунок 10 – Цикл развития огуречного цепня**

### **ЦИКЛ РАЗВИТИЯ МОНИЕЗИИ**

**Тип Плоские черви (Plathelminthes)**


**Класс Ленточные черви (Cestoda)**

Отряд Цепни (Cyclophyllidea)

Вид: мониезия (*Moniezia expansa*)

Мониезия (*Moniezia expansa*) паразитирует в тонком отделе кишечника крупного рогатого и мелкого скота, диких жвачных - мониезиоз. Больные животные выделяют зрелые членики с яйцами во внешнюю среду (рисунок 11). Передвигаясь, членики лопаются и рассеивают яйца. На пастбищах орибатидные клещи родов *Sheloribates*, *Zigoribatula* (в зависимости от зон) вместе с растениями, органическими веществами заглатывают яйца цестод. В кишечнике клеща онкосфера выходит из яйца, проникает в брюшную полость и через 2,5 – 5 месяцев, в зависимости от условий внешней среды и вида клеща, становится инвазионным цистицеркоидом.

Животные заражаются во время пастьбы, заглатывая с травой зараженных цистицеркоидами клещей. Продолжительность жизни цестод в кишечнике овец составляет 2,5-3 месяца, в редких случаях – около 7 месяцев.



А – сколекс; Б - гермафродитный членик; В - дефинитивный хозяин; Г – яйца;  
Д - промежуточный хозяин – орибатидный клещ с цистицеркоидом.

**Рисунок 11 – Цикл развития мониезии**

#### Краткая схема развития:

1. *Moniezia expansa*.
2. Для Д.Х.- мониезиоз.
3. Д.Х. – крупный рогатый скот, П.Х. – почвенные, орибатидные клещи.
4. У Д.Х. – тонкий отдел кишечника.
5. Инвазионная стадия для крупного рогатого скота – орибатидные, почвенные клещи с цистицеркоидами.

Из крупного рогатого скота во внешнюю среду выделяются зрелые членики паразита, которые лопаются и рассеивают яйца. П.Х. (почвенный орибатидный клещ) съедают яйца паразита → желудок → онкосфера → тело клеща и превращается в личинку цистицеркоид.

Дефинитивный хозяин заражается во время пастьбы, заглатывая с травой зараженных цистицеркоидами клещей.

#### ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ЛЕНТЕЦА ШИРОКОГО

**Тип Плоские черви (Plathelminthes)**

**Класс Ленточные черви (Cestoda)**

Отряд Лентецы (Pseudophyllidea)


Вид: лентец широкий (*Diphyllobothrium latum*)

Все лентецы – биогельминты. Дефинитивные хозяева - человек, кошки,

собаки, пушные звери, реже свиньи. Промежуточные хозяева – веслоногие раки (цикlop – *Cyclops strenuus*). Дополнительные хозяева представлены видами хищных пресноводных рыб (окунь, ерш, форель, налим, щука, хариус, сиг, судак, бычок и др.).

У дефинитивного хозяина лентец широкий (*Diphyllobothrium latum*) паразитирует в тонком отделе кишечника, вызывая заболевание дифиллоботриоз. Личинки - *плероцеркоиды* паразитируют в самых разных органах и тканях дополнительного хозяина (рисунок 12). Из организма окончательного хозяина во внешнюю среду выделяются яйца. Они должны попасть в воду, где в них за 20-25 суток формируется личинка *корацидий*.

Корацидий имеет округлую форму, покрыт ресничками и снабжен тремя парами крючков. Вышедшие из яиц корацидии активно плавают в воде и заглатываются раками. В раках формируется первая личиночная стадия паразита - *процеркоид* (за 14-20 суток). Затем раки поедаются рыбами, из кишечника рыб процеркоиды проникают в мышцы, икру, печень, подкожную клетчатку, где превращаются в *плероцеркоида* (инвазионную личинку) длиной 6-10 мм. Дефинитивные хозяева заражаются возбудителем при поедании инвазированной плероцеркоидами рыбы. В кишечнике собак лентец широкий достигает половой зрелости за 13-23 суток, человека – 60 суток. Продолжительность жизни гельминта у человека составляет до 29 лет, у собак – 394 суток.



А - дефинитивный хозяин; Б - стробила; В – сколекс; Г - гермафродитный членик;  
Д - незрелое яйцо; Е - зрелое яйцо с корацидием; Ж – корацидий; З - первый промежуточный хозяин – ракок с процеркоидом; И – процеркоид; К - 2-ой промежуточный хозяин – хищные рыбы, Л - плероцеркоид.

**Рисунок 12 – Цикл развития лентеца широкого**

### **Краткая схема развития:**

1. **Diphyllobothrium latum.**
2. У Д.Х. – дифиллоботриоз.
3. Д.Х. – человек, кошки, собаки, пушные звери; П.Х. – веслоногие раки (циклогоп), Доп.Х. - щука
4. У Д.Х. – паразитирует в тонком отделе кишечника.
5. Инвазионная стадия для человека – мясо рыбы, пораженное плероцеркоидом.

Человек с фекальными массами во внешнюю среду - воду- выделяет яйца паразита, где в них формируется личинка **корацидий**, которая заглатывается → П.Х (циклогоп), в теле которого формируется **процеркоид** → циклопа съедает хищная рыба → кишечник → полость тела → мышцы рыбы и формируется в **плероцеркоида**.

Дефинитивные хозяева заражаются возбудителем при поедании инвазированной плероцеркоидами хищной рыбы.

## **Класс НЕМАТОДЫ**

В половом отношении большинство круглых червей раздельнопольные, у многих форм ясно выражен половой диморфизм. Развитие паразитических видов происходит как с участием промежуточных хозяев (биогельминты), так и без них (геогельминты).

К **биогельминтам** относятся те паразиты, которые развиваются с участием двух или более организмов. В одном организме живут взрослые формы червя, в другом — личиночные стадии. К биогельминтам относится большинство представителей типа плоских червей, из круглых червей трихинелла, ришта мединская.

**Геогельминтами** называют тех паразитов, которые в процессе своего развития не требуют смены хозяев. Их яйца выводятся из организма вместе с калом во внешнюю среду, и при определенной температуре и влажности в них развиваются личинки. Такое яйцо, содержащее личинку, становится инвазионным. Попадая в организм дефинитивного хозяина (в его кишечник) личинки освобождаются от оболочек яйца, проникают в те или иные органы и вырастают в половозрелую форму. К геогельминтам относятся многие круглые черви: аскарида, остица, власоглав и другие.

### **ЦИКЛ РАЗВИТИЯ АСКАРИДЫ СВИНОЙ**

**Тип Первичнополостные (Nemathelminthes)**

**Класс Круглые черви, или нематоды (Nematoda)**

Вид: аскарида свиная (*Ascaris suis*)


Цикл развития у аскариса свиного (*Ascaris suis*) прямой, без участия промежуточного хозяина – геогельминт. Половозрелые самки аскарид откладывают в тонком кишечнике животного яйца (одна аскарида может отложить до 200 тыс. яиц в сутки), которые вместе с фекалиями выбрасываются во внешнюю среду, где при благоприятных условиях (температуре +20—

+30°C и достаточной влажности) в течение 2—3 недель внутри яиц развиваются подвижные инвазионные личинки (рисунок 13). При заглатывании таких яиц свиньи заражаются аскариозом. В кишечнике у них из яиц выходят личинки, которые через систему воротной вены с током крови попадают в печень. Из печени личинки через полую вену, правую половину сердца и легочную артерию заносятся в капилляры легких, где задерживаются некоторое время, подрастают, проникают в легочные альвеолы, мигрируют в бронхиолы, бронхи и трахею, а затем из трахеи откашливается в ротовую полость и заглатываются. Через 1,5—2,5 месяца в тонком кишечнике они развиваются во взрослые аскариды. Аскариды фиксируются, дугообразно изгибаюсь и упираясь головным и хвостовым концами тела в стенку кишечника; таким путем они противостоят перистальтическим движениям. Питаются паразиты содержимым кишечника, живут они там до 7—10 месяцев, после чего самопроизвольно отходят. Количество аскарид в кишечнике может быть самым различным: от единичных экземпляров до нескольких сотен и тысяч паразитов.

#### Краткая схема развития:

1. На примере аскариды свиной (у всех аскаридат цикл развития одинаковый) *Ascaris suis*.
2. Аскариоз.
3. Д.Х. – свинья.
4. У свиньи – тонкий отдел кишечника.
5. Инвазионная стадия – инвазионное яйцо.

Свинья с фекальными массами выделяет во внешнюю среду яйца паразита, где под действием температуры, влажности они становятся инвазионными (т.е. в яйце формируется личинка). Свинья заражается съев любой корм с инвазионными яйцами → кишечник → личинка → кровь → легкие → раздражение → откашливание → ротовая полость → тонкий отдел кишечника, где вырастает до половозрелой стадии и начинает откладывать яйца.



А - половозрелые аскариды; Б - окончательный хозяин; В – яйцо;  
Г - инвазионное яйцо.

**Рисунок 13 – Цикл развития аскариды свиной**

## ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ОСТРИЦЫ ДЕТСКОЙ

Тип Первичнополостные (Nemathelminthes)


Класс Круглые черви, или нематоды (Nematoda)

Вид: остица детская (*Enterobius vermicularis*)

Эта широко распространенная нематода паразитирует чаще всего у детей в толстом кишечнике, в нижнем отделе тонкого кишечника, в слепой кишке и в ее червеобразном отростке и потому вызывает иногда его воспаление — аппендицит, вызывая заболевание энтеробиоз.

Жизненный цикл остицы (*Enterobius vermicularis*) проходит без смены хозяев (геогельминт). После оплодотворения самки, по мере созревания постепенно передвигаются к прямой кишке и частично прикрепляются в перианальных складках хвостовым концом. При доступе кислорода они начинают выделять в перианальную область яйца, которые клейким секретом прикрепляют к коже хозяина, что вызывает сильный зуд.

В среднем одна самка откладывает до 11000 яиц. Яйца легко рассеиваются во внешней среде в большом количестве. Надо иметь в виду, что яйца, отложенные ночью, к утру (через 6-8 часов) уже инвазионны. Поэтому, если грязными руками они будут занесены в рот и проглочены, произойдет заражение человека (рисунок 14). Легкая возможность повторного заражения (автоинвазия) приводит к тому, что остицы обычно наблюдаются у больного в большом количестве.



А - половозрелая остица; Б - окончательный хозяин; В – яйцо; Г - инвазионное яйцо.

**Рисунок 14 – Цикл развития остицы детской**

## ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ОСТРИЦЫ ЛОШАДИННОЙ

Тип Первичнополостные (Nemathelminthes)

Класс Круглые черви, или нематоды (Nematoda)

Вид: остица лошадинная (*Oxyuris equi*)

Эта широко распространенная нематода паразитирует у лошадей в тол-

стом кишечнике, в слепой кишке, вызывая заболевание оксиуроз.

Жизненный цикл остицы (*Oxyuris equi*) проходит без смены хозяев (геогельминт). После оплодотворения самки, по мере созревания постепенно передвигаются к прямой кишке и частично прикрепляются в перианальных складках длинным хвостовым концом. При доступе кислорода они начинают выделять в перианальную область яйца, которые клейким секретом прикрепляют под корнем хвоста животного, что вызывает сильный зуд. Самки, выпавшие наружу, могут откладывать яйца, если попадут на поверхностные слои фекалии (при доступе кислорода). Яйца легко рассеиваются во внешней среде в большом количестве. Через 2-3 суток в яйце развивается инвазионная личинка. Животные заражаются перорально во время приема корма, воды, облизывая стены денника и кормушек, куда часто попадают яйца. В кишечнике лошади из яйца выходит личинка и через 35-40 суток становится половозрелой. Продолжительность жизни гельминтов ограничивается длительностью развития гельминтов в организме хозяина, так как после отложения яиц погибают самки.

#### **Краткая схема развития:**

1. *Oxyuris equi*, геогельминт.
2. Оксиуроз.
3. Д.Х. – лошадь.
4. У лошадей – толстый отдел кишечника
5. Инвазионная стадия – инвазионное яйцо.

Самка остицы выползает из анального отверстия лошади и на перианальные складки откладывает яйца, где под действием температуры, влажности они становятся инвазионными. Животное испытывает зуд в области ануса, чешется о стены денника, кормушки, тем самым, рассеивая инвазионные яйца. Д.Х. заражается съев любой корм с инвазионными яйцами → кишечник → личинка → толстый отдел кишечника, где и вырастает до половозрелой стадии и начинает откладывать яйца.

### **ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ВЛАСОГЛАВА СВИНОГО**

**Тип Первичнополостные (Nemathelminthes)**

**Класс Круглые черви, или нематоды (Nematoda)**

Вид: власоглав свиной (*Trichocephalus suis*)

Власоглавы (*Trichocephalus suis*) развиваются без промежуточного хозяина (геогельминт), паразитируют обычно в слепой кишке свиней, могут проникать в червеобразный отросток, вызывая заболевание трихоцефалёз. Яйца власоглавов с фекалиями выделяются наружу. Во внешней среде при благоприятной температуре и достаточной влажности в яйце за 21—28 дней формируется личинка (рисунок 15).


Заражение свиней происходит при заглатывании инвазионных яиц с кормом или водой. В кишечнике животного личинки выходят из яиц, проникают в толщу кишечных ворсинок слепой кишки, линяют, затем выходят в про-

свет кишечника, фиксируются головным концом в слизистой оболочке слепой кишки и питаются кровью (гематофаг). Через 45—47 дней личинки вырастают в половозрелых гельминтов. В кишечнике свиньи власоглавы живут 77—114 дней.

#### **Краткая схема развития:**

1. *Trichocephalus suis*, геогельминт.
2. Трихоцефалёз.
3. Д.Х. – свинья.
4. У свиней – толстый отдел кишечника.
5. Инвазионная стадия - инвазионное яйцо.

Из свиньи во внешнюю среду с фекальными массами выделяются яйца, где под действием температуры, влажности они становятся инвазионными. Д.Х. заражается, съев любой корм с инвазионными яйцами → кишечник → личинка → толстый отдел кишечника, где и вырастает до половозрелой стадии и начинает откладывать яйца, тонким головным концом прошивает стенку кишки и питается кровью – гематофаг.



А - половозрелые трихоцефалы; Б - окончательный хозяин; В – яйцо; Г - инвазионное яйцо.

**Рисунок 15 – Цикл развития власоглава**

#### **ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ТРИХИНЕЛЛЫ**

**Тип Первичнополостные (Nemathelminthes)**

**Класс Круглые черви, или нематоды (Nematoda)**

Вид: трихинелла (*Trichinella spiralis*)

Наиболее часто трихинеллёз встречается у свиней, собак, волков лисиц, кошек, медведей, крыс, мышей. К нему восприимчивы дикие кабаны барсуки, песцы, горностаи, норки, соболи, хорьки, ежи, тигры и многие другие дикие плотоядные и грызуны. Трихинеллёз представляет большую опасность для


человека. Трихинеллэз у людей протекает очень тяжело, плохо поддается лечению и часто оканчивается смертельным исходом. В развитии трихинеллы характерно наличие двух форм — кишечной и мышечной, а также миграция личинок. Развитие происходит без смены хозяев и без выхода во внешнюю среду (биогельминт) (рисунок 16). При трихинеллэзе одно и то же животное вначале бывает дефинитивным (кишечные трихинеллы), а затем промежуточным (мышечные личинки трихинеллы) хозяином гельминта. Животные заражаются при поедании трихинеллэзного мяса, в котором содержатся живые инкапсулированные личинки трихинелл. В желудке из капсул выходят личинки; они проходят в тонкий кишечник, внедряются в ворсинки слизистой кишки, где достигают половой зрелости через 2—3 дня. Половозрелые трихинеллы (*Trichinella spiralis*), оставаясь погруженными в стенку кишки головными концами, живут недолго — до четырех — шести недель. Самки оплодотворяются самцами, после чего самцы погибают, а самки, оставаясь в ткани, отрождают множество личинок (одна самка отрождает до 1500 и больше личинок). Они проникают в лимфатические, а затем в кровеносные сосуды и током крови разносятся по всему телу. Из кровеносных сосудов личинки внедряются в различные мышцы, где разрушают мышечные волокна, питаясь ими, и через несколько дней (до двух недель) личинки вырастают, сворачиваются в спираль и покрываются особыми капсулами, имеющими форму лимона. В дальнейшем капсулы пропитываются известью. В таком инцистированном состоянии личинки трихинелл остаются в мышцах хозяина до его смерти. Если содержащее капсулы трихинеллэзное мясо будет съедено другими животными (крысой или свиньей), в его желудке капсулы разрушаются, а вышедшие из них трихинеллы проходят в тонкий кишечник. Крысы могут заражаться трихинеллэзом или друг от друга, поедая трупы крыс, или же от свиней, поедая выброшенное трихинеллэзное мясо. Человек может заражаться трихинеллэзом, съедая трихинеллэзное свиное мясо.

Большая плодовитость трихинелл обуславливает наличие в мышцах зараженного животного огромного количества капсул с трихинеллами, что определяет в свою очередь попадание в кишечник одновременно большого количества трихинелл. Процесс внедрения многих тысяч личинок в мышцы и разрушение ими мускульных волокон приводит к тяжелому заболеванию человека трихинеллэзом, часто оканчивающимся смертью.

#### **Краткая схема развития:**

1. *Trichinella spiralis*: а) ♀ - живородящая; б) нет выхода во внешнюю среду; в) обширный круг хозяев; г) одно и то же животное является и Д.Х., и П.Х.. Биогельминт.
2. Трихинеллэз.
3. Д.Х. – дикие и домашние свиньи.
4. Имаго – тонкий отдел кишечника Д.Х., личинка – поперечно-полосатая мускулатура.
5. Алиментарно – мясо дикого кабана или домашней свиньи с личинками трихинеллы в мышцах.

Дикий кабан съедает мышь, в мышцах которой находятся личинки трихинеллы (трихинеллезное мясо) → желудок → личинки → тонкий отдел кишечника → ♀♂ → ♂ погибают, а ♀ начинают отрождать личинок → они мигрируют в поперечно-полосатую мускулатуру кабана → сворачиваются S – образно, покрываются капсулой → человек употребляет мясо дикого кабана и съедает трихинеллезное мясо → желудок → личинки → тонкий отдел кишечника → ♀♂ → ♂ погибают, а ♀ начинают отрождать личинок → они мигрируют в поперечно-полосатую мускулатуру человека → сворачиваются S –образно, покрываются капсулой (и также пройдет цикл развития у любого плотоядного или всеядного животного).



А, Б – хозяева; В- половозрелые трихинеллы (в кишечнике); Г- личинки трихинеллы в мышцах.

**Рисунок 16 – Цикл развития трихинеллы**

### ЦИКЛ РАЗВИТИЯ РИШТЫ МЕДИНСКОЙ

**Тип Первичнополостные (Nemathelminthes)**

**Класс Круглые черви, или нематоды (Nematoda)**


Вид: ришта мединская(*Dracunculus medinensis*)

Ришта (*Dracunculus medinensis*) интересна тем, что, в отличие от большинства нематод, ее жизненный цикл происходит со сменой хозяев (биогельминт). Заболевание риштой (дракункулёз), паразитирующей в половозрелом состоянии в подкожной клетчатке рук и ног человека, распространено в тропиках и субтропиках, в Иране, Индии, тропической Африке.

Обычно у человека обнаруживается самка ришты, представляющая собой длинного и тонкого червя. Самка может достигать 150 см и даже больше в длину при толщине тела в среднем в 1,5 мм.

Чаще всего на ногах человека в подкожной клетчатке, появляется затвер-

дение, а затем кожа изъязвляется, и в глубине язвы становится видна часть свернутого в клубок червя. В таком состоянии ришта отрождает множество личинок. При мытье ног больного личинки попадают в водоемы и заглатываются раками — циклопами, а затем проникают в полость тела циклопа, вырастая до 1 мм длины. При употреблении воды человеком могут быть легко проглочены циклопы с содержащимися в них личинками, которые затем совершают сложную миграцию в теле человека.



А - дефинитивный хозяин; Б – самка; В - локализация паразита в ноге человека (рисунок с рентгенограммы); Г - инвазионная личинка, отрождаемая самкой; Д - промежуточный хозяин – циклоп, зараженный личинками.

**Рисунок 17 – Цикл развития ришты мединской**

#### **Краткая схема развития:**

1. *Dracunculus medinensis* (биогельминт).
2. Дракункулэз.
3. Д.Х. – человек, собака, П.Х. – веслоногий рак циклоп.
4. Паразитирует в подкожной клетчатке рук и ног человека.
5. Алиментарно, с водой, в которой находится ракок, внутри которого личинки ришты.

Взрослый паразит длиной 1-1,5м паразитирует в подкожной клетчатке рук и ног человека, вызывая на поверхности кожи незаживающие язвы. Самка паразита высасывает головной конец через язвы и начинает отрождать личинки только в том случае, если человек соприкасается с водой. Яйца паразита заглатывает веслоногий ракок, в котором из яиц формируются личинки. Если человек или собака выпьет воду, в которой будет находиться ракок, зараженный личинкой ришты, то произойдет заражение *Dracunculus medinensis*.

## **Класс КОЛЮЧЕГОЛОВЫЕ**

### **ЦИКЛ РАЗВИТИЯ СКРЕБНЯ-ВЕЛИКАНА**

**Тип Колючеголовые (Acanthocephales)**

**Класс Колючеголовые(Acanthocephala)**

**Вид скребень-великан (Macracanthorhynchus hirudinaceus)**

Скребень-великан – биогельминт. Дефинитивные хозяева – свинья, кабан.

Самка паразита в тонком кишечнике ежесуточно выделяет огромное количество яиц, которые при выходе с фекалиями наружу поедаются промежуточными хозяевами (личинками майских жуков, бронзовок, жужелицы, жуков-носорогов, навозников). В кишечнике личинок жуков из яйца скребня выходит эмбриональная личинка – акантор, которая развивается до инвазионной личинки – акантеллы. Акантеллы белого цвета, длиной 3,6-4,4 мм и шириной 1,5-1,8 мм. Акантеллы в теле промежуточного хозяина могут жить до 3 лет, находясь во всех фазах развития: личинка, куколка и взрослая особь. Свинья и другие животные заражаются при поедании жуков и их личинок, инвазированных акантеллами. В кишечнике свиньи акантеллы освобождаются от цист, внедряются хоботком в толщу слизистой оболочки и вырастают до половозрелой стадии через 2,5-4 месяца. Продолжительность жизни скребней составляет около 23 месяцев.

#### **Краткая схема развития:**

1. **Macracanthorhynchus hirudinaceus.**
2. Макракантаринхоз.
3. Д.Х. – дикие и домашние свиньи, П.Х. – личинка майского жука.
4. Паразитирует в тонком отделе кишечника свиней.
5. Алиментарно, с кормом, в котором будет находиться личинка майского жука с акантеллой.

Из дефинитивного хозяина с фекальными массами выделяются яйца паразита, внутри которых содержится личинка **акантор**. Во внешней среде яйца заглатываются П.Х (личинка майского жука), и в них акантор превращается в **преакантеллу**. Спустя некоторое время она превращается в акантеллу. Д.Х. заражается при съедании личинки майского жука с **акантеллой**.

## **КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:**

1. Чем отличаются циклы развития эймерии кроличьей от малярийного плазмодия?
2. Какие стадии развития включают в себя циклы развития споровиков?
3. Какая стадия развития у эймерий проходит во внешней среде?
4. Кто является окончательным и промежуточным хозяином в цикле развития малярийного плазмодия?
5. Перечислите стадии развития печеночного сосальщика в организме промежуточного хозяина.
6. Кто является хозяевами в цикле развития ланцетовидного сосальщика?
7. Какая личиночная стадия отсутствует в цикле развития ланцетовидного сосальщика?
8. Каким образом может заразиться окончательный хозяин описторхозом?
9. Как называется инвазионная личинка у ланцетовидного и кошачьего сосальщика?
10. У кого и где паразитирует лягушачий сосальщик?
11. Перечислите инвазионные личинки ленточных червей.
12. У кого и где локализуются финны цистицерк и ценур?
13. У кого и где локализуются финны эхинококк и цистицеркоид?
14. Объясните, что такое онкосфера?
15. Кто является промежуточным хозяином в цикле развития эхинококка и как происходит заражение?
16. У каких ленточных червей промежуточными хозяевами являются: блохи, власоеды, орибатидные почвенные клещи?
17. Перечислите личиночные стадии и хозяев в цикле развития лентеца широкого.
18. Перечислите особенности цикла развития трихинеллы?
19. Чем отличаются циклы развития остицы лошадиной от аскариды лошадиной?
20. Где локализуется власоглав свиной в организме хозяина?
21. Какие условия необходимы для того чтобы яйцо нематод стало инвазионным?
22. Где паразитируют половозрелые особи трихинеллы и ее личинки?
23. Био- или геогельминт ришта мединская?
24. Что выделяет во внешнюю среду половозрелая самка ришты мединской?
25. Как происходит заражение дефинитивных хозяев нематодами?

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Догель, В. А. Зоология беспозвоночных : учебник для университетов / В. А. Догель ; ред. Ю. И. Полянский. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 606 с.
2. Зоология : учебное пособие для студентов вузов по специальностям «Ветеринарная медицина», «Зоотехния» / А. И. Ятусевич [и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 448 с. : ил. – Библиогр.: с. 425–426.
3. Зоология. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Ветеринарная медицина», «Ветеринарная санитария и экспертиза», «Ветеринарная фармация», «Зоотехния» / А. И. Ятусевич [и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2012. – 316 с. : ил. – Библиогр.: с. 312–313.
4. Натали, В. Ф. Зоология беспозвоночных : для биологических факультетов пединститутов / В. Ф. Натали ; ред. О. Н. Сазонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пресвящение, 1975. – 487 с. : ил.
5. Паразитология и инвазионные болезни животных : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ветеринария» / М. Ш. Акбаев [и др.] ; ред. М. Ш. Акбаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : КолосС, 2008. – 776 с. : рис.
6. Практикум по зоологии : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Ветеринарная медицина» и «Зоотехния» / А. И. Ятусевич [и др.]. – Витебск : ВГАВМ, 2003. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 267
7. Ятусевіч, А. І. Пратазойныя захворванні сельскагаспадарчых жывел / А. І. Ятусевіч. – Мінск : Ураджай, 1993. – 174 с. : іл. – Бібліягр.:с. 171–172.

## СХЕМА ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ НЕКОТОРЫХ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЧЕРВЕЙ

Название паразита	Окончательный хозяин	Внешняя среда и стадии паразита в ней	Промежуточный хозяин	Стадии паразита в промежуточном хозяине	Внешняя среда и стадии паразита в ней	Дополнительный хозяин	Стадии паразита в дополнительном хозяине	Инвазионное начало
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Печеночный сосальщик (<i>Fasciola hepatica</i>)</b>	крупный рогатый скот и другие травоядные млекопитающие	вода яйцо, мирадицидий	малый прудовик	спороциста, редия, церкарий	вода церкарий, адальескардий	-	-	адолескардий
<b>Ланцетовидный сосальщик (<i>Dicrocoelium lanceatum</i>)</b>	крупный, мелкий рогатый скот и другие млекопитающие	почва мирадицидий	сухопутный моллюск	спороциста, дочерняя спороциста, церкарий	почва церкарий	муравей	церкарий, метоцеркарий	метоцеркарий
<b>Кошачий сосальщик (<i>Opistorchis felineus</i>)</b>	кошка, собака, человек	вода мирадицидий	пресноводный моллюск	спороциста, редия, церкарий	вода редия,	рыбы семейства карповых	церкарий, метоцеркарий	метоцеркарий
<b>Полистома (<i>Polystoma integrerium</i>)</b>	лягушки		головастик		-	-	-	
<b>Бычий цепень (<i>Taeniarynchus saginatus</i>)</b>	человек	почва яйцо с онкосферой	крупный рогатый скот	личинка - цистицерк	-	-	-	цистицерк
<b>Свиной цепень (<i>Taenia solium</i>)</b>	человек	почва яйцо с онкосферой	свинья	Личинка – цистицерк	-	-	-	цистицерк
<b>Огуречный цепень (<i>Dipylidium caninum</i>)</b>	собака, кошка, пушные звери	почва яйцо с онкосферой	блоха, власоед	личинка - цистицеркоид	-	-	-	цистицеркоид

<b>Эхинококк (<i>Echinococcus granulosus</i>)</b>	псовые	<b>почва</b> яйцо с он-косферой	млекопитающие	личинка - эхинококк	-	-	-	эхинококк
<b>Мониезия (<i>Moniezia expansa</i>)</b>	крупный и мелкий рогатый скот	<b>почва</b> яйцо с он-косферой	орибатидные клещи	личинка - цистицеркоид	-	-	-	цистицеркоид
<b>Мозговик овечий (<i>Multiceps multiceps</i>)</b>	псовые	<b>почва</b> яйцо с он-косферой	мелкий рогатый скот	личинка - ценур	-	-	-	ценур
<b>Лентец широкий (<i>Diphyllobothrium latum</i>)</b>	человек, кошка, собака	<b>вода</b> яйцо, корацидий	пресноводный рак	личинка - прлероцеркоид	-	пресноводная хищная рыба	плероцеркоид	плероцеркоид
<b>Аскарида свиная (<i>Ascaris suum</i>)</b>	свинья	<b>почва</b> яйцо	-	-	-	-	-	яйцо с инвазионной личинкой
<b>Острица детская (<i>Enterobius vermicularis</i>)</b>	человек	<b>область промежности</b> яйцо	-	-	-	-	-	яйцо с инвазионной личинкой
<b>Острица лошадиная (<i>Oxyuris equi</i>)</b>	лошадь	<b>область промежности</b> яйцо	-	-	-	-	-	яйцо с инвазионной личинкой
<b>Трихинелла (<i>Trichinella spiralis</i>)</b>	свинья, кабан	-	свинья	личинка	-	-	-	личинка
<b>Власоглав (<i>Trichocephalus suis</i>)</b>	свинья	<b>почва</b> яйцо	-	-	-	-	-	яйцо с инвазионной личинкой
<b>Ришта мединская (<i>Dracunculus medinensis</i>)</b>	человек	<b>вода</b> личинка	пресноводный рак	личинка	-	-	-	личинка
<b>Скрепень-великан (<i>Macracantharhynchus hirudinaceus</i>)</b>	свинья	<b>почва</b> личинка	личинка майского жука	акантелла	-	-	-	акантелла

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>4</b>
Применяемая терминология.....	4
Примерный план ответа жизненных циклов паразитов на примере эймерии кроличьей .....	6
Цикл развития эймерии кроличьей.....	6
Цикл развития малярийного плазмодия.....	8
Цикл развития печеночного сосальщика .....	11
Цикл развития ланцетовидного сосальщика .....	14
Цикл развития кошачьего сосальщика .....	16
Цикл развития полистомы .....	17
Цикл развития бычьего цепня.....	18
Цикл развития свиного цепня.....	20
Цикл развития эхинококка .....	21
Цикл развития овечьего мозговика .....	23
Цикл развития огуречного цепня.....	25
Цикл развития мониезии .....	26
Цикл развития лентеца широкого .....	27
Цикл развития аскариды свиной .....	29
Цикл развития остицы детской .....	31
Цикл развития остицы лошадиной .....	31
Цикл развития власоглава свиного.....	32
Цикл развития трихинеллы.....	33
Цикл развития ришты мединской .....	35
Цикл развития скребня-великана .....	37
Контрольные вопросы.....	38
Список рекомендуемой литературы .....	39
Приложение .....	40

## **УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»**

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринарной медицины и зоонженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпусов, клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. В составе академии 5 факультетов: ветеринарной медицины; биотехнологический; повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; заочного обучения; довузовской подготовки, профориентации и маркетинга. В ее структуру также входят Аграрный колледж УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Гомельской области и в г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного образования НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМиБ).

В настоящее время в академии обучается около 6 тысяч студентов, как из Республики Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечивают около 350 преподавателей. Среди них 7 академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси и ряда зарубежных академий, 24 доктора наук, профессора, более чем две трети преподавателей имеют ученую степень кандидатов наук.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ ПВМиБ, 24 кафедральных научно-исследовательских лабораторий, учебно-научно-производственного центра, филиалов кафедр на производстве. В состав НИИ входит 7 отделов: клинической биохимии животных; гематологических и иммунологических исследований; физико-химических исследований кормов; химико-токсикологических исследований; мониторинга качества животноводческой продукции с ПЦР-лабораторией; световой и электронной микроскопии; информационно-маркетинговый. Располагая уникальной исследовательской базой, научно-исследовательский институт выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, осуществляет анализ всех видов биологического материала (крови, молока, мочи, фекалий, кормов и т.д.) и ветеринарных препаратов, что позволяет при помощи самых современных методов выполнять государственные тематики и заказы, а также на более высоком качественном уровне оказывать услуги предприятиям агропромышленного комплекса. Активное выполнение научных исследований позволило получить сертификат об аккредитации академии Национальной академии наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь в качестве научной организации.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабораторной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, является ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной системе (СТБ ISO 9001 – 2009).

[www.vsavm.by](http://www.vsavm.by)

210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212)51-68-38,  
тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга);  
51-69-47 (НИИ ПВМиБ); e-mail: vsavmpriem@mail.ru.

Учебное издание

**Ятусевич Антон Иванович,  
Олехнович Николай Иванович,  
Медведская Тамара Вячеславовна и др.**

# **Биология развития эндопаразитических организмов**

Учебно-методическое пособие

Ответственный за выпуск Н. И. Олехнович  
Технический редактор Е. А. Алисейко  
Компьютерный набор Л. И. Рубина  
Компьютерная верстка Е. В. Морозова  
Корректор Т. А. Драбо

Подписано в печать 28.07.2016. Формат 60x84/16. Бумага офсетная.  
Ризография. Усл. п. л. 2,75. Уч.-изд. л. 1,98. Тираж 100 экз. Заказ № 1613.

Издатель и полиграфическое исполнение:  
учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета»  
государственная академия ветеринарной медицины».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  
распространителя печатных изданий № 1/ 362 от 13.06.2014.

ЛИ №: 02330/470 от 01.10.2014 г.  
Ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026, г. Витебск.  
Тел.: (0212) 51-75-71.  
E-mail: [rio\\_vsavm@tut.by](mailto:rio_vsavm@tut.by)  
<http://www.vsavm.by>

ISBN 978-985-512-919-7

A standard linear barcode representing the ISBN number 978-985-512-919-7. Below the barcode, the numbers are printed vertically: 9 789855 129197.